



دانشگاه شهروردی و فن مهندسی کاشان

نشریه پژوهش در نسخه‌وارکنندگان

جلد ششم، شماره دوم، ۱۳۹۷

http://ejrr.gau.ac.ir

اثر روش‌های مختلف یخ‌گشایی بر فراسنجه‌های اسپرم منجمد قوچ قزل

صدیقه وطن خواه^۱، حسین دقیق کیا^۲، غلامعلی مقدم^۳ و مرضیه ابراهیمی^۴

^۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد، استاد و استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

تاریخ دریافت: ۹۷/۱/۲؛ تاریخ پذیرش: ۹۷/۶/۱۸

چکیده

سابقه و هدف: امروزه عمل تلقیح مصنوعی از جایگاه ویژه‌ای در بهبود راندمان تولید، اصلاح و بهبود پیشرفت ژنتیکی برخوردار است. به منظور تحقق بخشیدن به بسیاری از مزایای بالقوه تلقیح مصنوعی، ذخیره‌سازی منی برای بلند مدت یک امر ضروری محسوب می‌شود. این امر توسط فرایند انجماد محقق می‌شود. مراحل انجماد از جمله فرایند یخ‌گشایی منجر به تغییرات مورفولوژیکی، آسیب به عملکرد های طبیعی اسپرم و در نهایت کاهش باروری می‌شود. بنابراین، بهبود روش یخ‌گشایی منی قوچ با شخص‌های کیفی اسپرم ارتباط داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات دو روش یخ‌گشایی بر فراسنجه‌های میکروسکوپی، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیدیسموتاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل منی قوچ پس از فرایند انجماد-یخ‌گشایی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، نمونه‌های منی از پنج رأس قوچ قزل (سن ۳ تا ۴ سال)، در فصل تولیدمثلی و با استفاده از مهبل مصنوعی، دو بار در هفته جمع‌آوری شدند. برای از بین بردن اثرات فردی دام‌های نر، نمونه‌های منی در هر بار اسپرم‌گیری با هم مخلوط شده و سپس مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه‌ها با رقیق‌کننده تریس حاوی ۱/۵ درصد لستین سویا و ۷ درصد گلیسروول رقیق شدند. نمونه‌های رقیق شده در پاییوت ۰/۲۵ میلی لیتر پر و در معرض بخار ازت منجمد و تا زمان ارزیابی در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند. پاییوت‌های حاوی منی در حمام آب گرم توسط دو پروتکل: ۳۷°C به مدت ۳۰ ثانیه و ۶۰°C به مدت ۶ ثانیه یخ‌گشایی شدند. به دنبال فرایند انجماد-یخ‌گشایی، اثرات زمان و دمای یخ‌گشایی بر ویژگی‌های تحرک، زنده‌مانی، یکپارچگی غشاء پلاسمایی، ناهنجاری‌های مورفولوژیکی، غلاظت مالون‌دی‌آلدهید، فعالیت‌های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیدیسموتاز و ظرفیت تمام آنتی اکسیدان منی ارزیابی شدند. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد و مدل آماری شامل اثر دما و زمان یخ‌گشایی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط برنامه آماری SAS و به کمک روش GLM انجام شد و اختلاف میانگین‌ها به روش توکی مورد مقایسه قرار گرفتند. اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد گزارش شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که فراسنجه‌های حرکتی اسپرم از جمله درصد تحرک پیش‌رونده، سرعت در مسیر مستقیم، سرعت در مسیر منحنی در دمای ۳۷°C به ۶۰°C اختلاف معنی‌داری نداشتند ولی از نظر عددی تغییراتی در آنها مشاهده شد. همچنین درصد زنده‌مانی و یکپارچگی غشاء پلاسمایی در ۳۷°C به مدت ۳۰ ثانیه به ۶۰°C به مدت ۶ ثانیه از نظر عددی تغییر مشتی یافت اما این افزایش نیز غیرمعنی دار بود. همچنین میزان اسپرم‌های ناهنجار در روش یخ‌گشایی ۶۰°C برای ۶ ثانیه به ۳۷°C ۳۰ ثانیه بهبود نیافت. علاوه بر این نتایج حاصل از مقایسه پراکسیداسیون لبید، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیدیسموتاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در دو پروتکل یخ‌گشایی معنی‌دار نبود.

*نویسنده مسئول: daghhighkia@tabrizu.ac.ir

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از روش های یخ گشایی، شاخص تحرک، بقاء و وضعیت اکسیداتیو در روش یخ گشایی 60°C به مدت ۶ ثانیه بهبود نیافت و نتوانست جایگزین مناسبی برای روش یخ گشایی 37°C به مدت ۲۰ ثانیه باشد.

واژه های کلیدی: سرعت یخ گشایی، فراسنجه های کیفی، منی منجمد، قوچ

رو بوده و در نتیجه باید با دو برابر سرعت انجماد از منطقه بحرانی دما (15°C - به 60°C) عبور کند (۲۹، ۴۹). هر دو نرخ سردسازی و یخ گشایی بر روی غشاء پلاسمایی اسپرم و در نتیجه زنده مانی موثر هستند (۷، ۳۱). به نظر می رسد برای بهبود عملکرد اسپرم، یخ گشایی سریع ضروری است، زیرا احتمالاً کریستال یخ داخل سلولی که در طی انجماد شکل گرفته، ممکن است در طی یخ گشایی آهسته رشد کند (۱۳، ۳۸-۴۲°C). بسیاری از محققان از دمای 42°C - 42°C برای یخ گشایی منی منجمد قوچ استفاده کرده اند. برخی دیگر یخ گشایی در دمای بالای $60-75^{\circ}\text{C}$ را گزارش کردنده که با توجه به تحرک، یکپارچگی آکروزوم و باروری اسپرماتوزوا پس از یخ گشایی، با دماهای $38-42^{\circ}\text{C}$ قابل مقایسه بود (۴۹). مشاهده شده است که با افزایش دما ($37-70^{\circ}\text{C}$) میزان تحرک بهبود یافته است (۴۹). اندرسن و آمدال (۱۹۷۲) گزارش کردنده که یخ گشایی در 75°C بهتر از 35°C است (۴). با اینحال، در مطالعه ای دیگر گزارش شد که یخ گشایی در $36-40^{\circ}\text{C}$ یا $50-70^{\circ}\text{C}$ ، بر تحرک و یکپارچگی آکروزوم اسپرماتوزوا اثرگذار نمی باشد (۴۴). چندین مطالعه دیگر به منظور ارزیابی تأثیر دمای یخ گشایی بالا بر روی زنده مانی و تحرک اسپرم با استفاده از نرخ های یخ گشایی متفاوت روی گاو (۴۵ و ۴۵). بز، قوچ و سگ انجام شده است (۷، ۳۸، ۴۱ و ۴۲). پلاسمای منی و اسپرماتوزوئید به منظور حفاظت از آسیب گونه های اکسیژن فعال، حاوی تعدادی آنتی اکسیدان اندوژنوس (گلوتاتیون

مقدمه

تلقیح مصنوعی به طور قابل توجهی می تواند میزان پیشرفت ژنتیکی را افزایش دهد (۳۰). حفاظت و نگهداری طولانی مدت مایع منی به علت استفاده گسترده از تلقیح مصنوعی و تأثیر مسائلی مانند فاصله بین مکان های جمع آوری و تلقیح، انتقال بیماری ها و تلقیح تعداد زیادی ماده در مدت زمان کوتاه، موضوعی است که همواره مورد توجه قرار داشته است (۴۰). برای موفقیت تلقیح مصنوعی و کسب باروری مطلوب، داشتن تحرک و زنده مانی بالای اسپرماتوزوئید پس از یخ گشایی عامل مهمی به شمار می آید (۱۲، ۲۷). انجماد و یخ گشایی منی، درصد اسپرم های متحرک را کاهش داده و باعث آسیب های ساختاری، بیوشیمیایی و عملکردی می شود (۵۱). بنابراین، نه تنها انجماد بلکه یخ گشایی هم ممکن است به سلول اسپرم آسیب برساند (۲۲). یخ گشایی باعث بازگشت سلول اسپرم به دمای فیزیولوژیکی می شود، لذا به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به سلول اسپرم یخ گشایی باید با دقیقت انجام شود (۹). نرخ یخ گشایی بطور قابل توجهی در زنده مانی اسپرم مؤثر بوده و به نظر می رسد این امر تحت تأثیر عوامل متعددی همچون نوع رقیق کننده، غلظت گلیسرول، روش بسته بندی و نرخ انجماد است (۴۷). در فرایند انجماد-یخ گشایی، فاز گرم شدن دقیقاً به اندازه فاز انجماد، برای زنده مانی اسپرم مهم می باشد (۳۱). همچنین به منظور جلوگیری از تشکیل بلورهای یخ داخل سلولی در اسپرم، یخ گشایی سریع ضروری است (۴۹). اسپرماتوزوا که تا دمای 196°C - زنده مانده اند، اکنون با چالش گرم شدن و یخ گشایی روبه-

آب گرم با دمای 37°C به مدت ۳۰ ثانیه و 60°C به مدت ۶ ثانیه و تاثیر آن بر روی فراسنجه‌های اسپرم و وضعیت اکسیداتیو پس از یخ‌گشایی است.

مواد و روش‌ها

مواد شیمیایی: مواد شیمیایی مورد استفاده در این مطالعه شامل: تریس (با شماره کاتالوگ ۳۸۲۱۰۸) و اسید سیتریک (با شماره کاتالوگ ۲۴۴۱۰۰) از شرکت مرک^{۱۰} و فروکتوز (با شماره کاتالوگ F۲۵۴۳) از شرکت سیگما^{۱۱} تهیه شد.

حیوانات و جمع آوری اسپرم: نمونه‌های منی از ۵ رأس قوچ فرل بالغ (۳-۴ سال)، با ژنتیک برتر و ظرفیت باروری بالا گرفته شد. دامها تحت شرایط محیطی و تغذیه‌ای یکسان (جیره با ۲۰٪ کنسانتره ۷۵٪ جو و ۲۵٪ ذرت) و ۸۰٪ یونجه) بوده همچنین به آب و نمک لیسیدنی دسترسی آزاد داشتند. نمونه‌گیری هفته‌ای دو بار، در فصل تولیدمثلی و با استفاده از مهبل مصنوعی (42°C) انجام شد. برای از بین بردن اثرات فردی دام‌های نر، مقادیر مساوی از نمونه‌های منی از هر ۵ رأس قوچ، در هر تکرار آزمایشی با هم مخلوط شده و سپس مورد استفاده قرار گرفتند. در هر انزال نمونه‌های با حجم بیش از ۰/۷۵ میلی‌لیتر، غلاظت بیش 10×3 اسپرم در میلی‌لیتر، تحرک پیش‌رونده بیش از ۸۰٪ و اسپرم غیرطبیعی کمتر از ۱۰٪ به عنوان اسپرم طبیعی در نظر گرفته شدند (۳۲).

رقیق‌سازی، انجماد و یخ‌گشایی منی: از یک رقیق‌کننده بر پایه تریس ۷۱/۷۲ میلی‌مولا، فروکتوز ۵۰/۵۵ میلی‌مولا، اسید سیتریک ۷۷/۸۷ میلی‌مولا (۳۲۰ میلی‌اسمول/کیلوگرم، اسیدیته ۷/۲)، عوامل محافظ انجمادی با میزان ۷٪ گلیسرول و ۱۵٪ (وزن/حجم) لستین سویا استفاده شد. قبل از شروع کار محیط‌های انجمادی در بن ماری 37°C قرار داده

پراکسیداز^۳/ردوکتاز^۴، سوپراکسیدسیموتاژ^۵ و کاتالاز^۶ هستند که می‌توانند اثر سمی بالقوه گونه‌های اکسیژن فعال را خشی کنند. ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پایین در پلاسمای منی نقش کلیدی در ناباروری مرد دارد. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل^۷، مجموعه‌ی آنتی اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی را شامل می‌شود. آنتی اکسیدان‌های پلاسمای منی به عنوان آنزیم جاروب کننده‌ی^۸ گونه‌های اکسیژن فعال، قادر به تحریب آنیون سوپراکسید، هیدرژن پراکسید و پراکسیدهای لیپیدی هستند. همچنین سوپراکسید دیسموتاز مسئول حفظ تعادل بین تولید و تحریب گونه‌های واکنشی اکسیژن است (۵۱). تولید بدون کنترل گونه‌های اکسیژن فعال که بیش از ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسمای منی است منجر به استرس اکسیداتیو^۹ می‌شود که برای اسپرماتوزوئید مضر است (۵۸). پتانسیل مهاری در غدد جندی و مایع منی به طور معمول با سطوح کافی از آنتی اکسیدان‌های اندوژنوس حفظ می‌شود. این تعادل را می‌توان به عنوان وضعیت استرس اکسیداتیو اشاره کرد و ارزیابی آن ممکن است نقش مهمی در نظارت بر آسیب اسپرم و ناباروری داشته باشد (۵۲). یکی از عوامل مهم در انجماد - یخ‌گشایی منی از دست دادن آنزیم‌های اندوژنوس است که باعث از دست دادن تحرک و کاهش متابولیسم می‌شود (۲). لذا، بهبود روش یخ‌گشایی منی قوچ با شاخص‌های کیفی اسپرم ارتباط داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، مقایسه دو روش یخ‌گشایی منی قوچ در پایوت‌های غوطه‌ور شده در

3. Glutathione peroxidase (GPx)

4. Glutathione reductase

5. Superoxidase dismutase (SOD)

6. Catalase

7. Total antioxidant capacity (TAC)

8. Scavenger

9. Oxidative stress

10. Merck (Darmstadt, Germany)

11. Sigma (St. Louis, MO, USA)

(میلی متر در ثانیه)، تحرک عرضی سر^{۱۸} (میلی متر)، فرکانس حرکات جانبی^{۱۹} (هر تر)، راستی مسیر طی شده^{۲۰} (درصد)، خطی بودن تحرک^{۲۱} (درصد). برای ارزیابی وضعیت حداقل ۲۰۰ اسپرم مورد بررسی قرار گرفت.

زنده‌مانی اسپرم: زنده‌مانی اسپرم با روش رنگ‌آمیزی ائوزین-نیگروزین انجام شد^(۳۶). ترکیبات رنگ شامل: ائوزین-۷۱/۶۷ گرم، نیگروزین ۱۰ گرم و سیترات سدیم ۲/۹ گرم، در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل شدند. برای رنگ‌آمیزی، ۱۰ میکرولیتر نمونه اسپرم رقیق شده با ۲۰ میکرولیتر از رنگ ائوزین-نیگروزین سریعاً روی لام مخلوط و گسترشی از آن تهیه شد و در مجاورت هوا خشک گردید. در بررسی میکروسکوپی لام، اسپرم‌های صورتی یا قرمز رنگ به عنوان اسپرم‌های مرده و اسپرم‌های سفید رنگ به عنوان اسپرم‌های زنده در نظر گرفته شد. تعداد ۲۰۰ اسپرم در هر لام با استفاده از میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی اسپرم‌های غیرطبیعی: به منظور بررسی درصد اسپرم‌های غیرطبیعی، نمونه‌های منی با استفاده از محلول‌هانکوک ارزیابی شد^(۳۳). برای ارزیابی ۱۵ اسپرم‌های با مورفولوژی غیرطبیعی، حداقل ۱۰۰۰ میکرولیتر از هر نمونه اسپرم به لوله‌های حاوی ۱۰۰۰ میکرو لیتر محلول‌هانکوک (با مخلوط کردن فرمالین ۶۲/۵ میلی لیتر، محلول سولفات سدیم ۱۵۰ میلی لیتر، و آب مقطر دو بار تقطیر ۵۰۰ میلی لیتر) اضافه شد، سپس ۱۰ میکرولیتر از نمونه منی بر روی لام قرار داده شد و با استفاده از میکروسکوپ فازکتراست تعداد ۲۰۰ اسپرم در هر لام شمارش شده و درصد کل اسپرم‌های غیرطبیعی (ناهنجری‌های سر، سرهای

شد. سپس ۱/۵٪ لستین سویا و ۷٪ گلیسرول به محیط رقیق‌کننده بر پایه تریس اضافه شده و رقیق‌سازی نمونه‌های منی به نسبت ۱ به ۲۰ و در دمای ۳۷°C انجام گرفت. سپس فالکون‌های حاوی نمونه منی در ظرف محتوی ۱۰۰ میلی لیتر آب ۳۷°C به منظور رسیدن به تعادل و سرد سازی تا ۴°C در یخچال به مدت ۲ ساعت قرار داده شد. بلافاصله پس از سرد نمودن نمونه‌ها در داخل پایوت‌های انجام داد ۰/۲۵ میلی لیتر (با غلظت نهایی ۴×۱۰^۶ اسپرم در میلی لیتر) کشیده شد و در نهایت نمونه‌های منی سرد شده به فاصله ۴ سانتی‌متری بالای سطح ازت به مدت ۷ دقیقه قرار گرفته و سپس سریعاً پایوت‌ها به داخل ازت مایع ۱۹۶°C-غوطه‌ور شدند^(۳۷). به منظور ارزیابی و مقایسه نمونه‌های منی در دو روش یخ‌گشایی، پایوت‌های حاوی نمونه منی در حمام آب گرم ۳۷°C به مدت ۳۰ ثانیه و ۶۰°C به مدت ۶ ثانیه یخ‌گشایی شد^(۱).

ارزیابی اسپرم‌ماتوزوئید پس از یخ‌گشایی

تحرک اسپرم: فراسنجه‌های تحرک اسپرم پس از یخ‌گشایی با استفاده از سیستم کامپیوترا آنالیز اسپرم Labomed LX400: Labomed Inc., Culver city (CA, USA^{۱۲}) و یک دوربین دیجیتالی (MD50-5MP USP2.0^{۱۳}) با تعداد ۵۳ فریم در دقیقه ارزیابی شدند. مقادیر فراسنجه‌های حرکتی به صورت زیر ثبت شد: تحرک کل^{۱۴} (درصد)، تحرک پیش‌رونده^{۱۵} (درصد)، سرعت میانگین حرکت اسپرم^{۱۶} (میلی متر در ثانیه)، سرعت در مسیر منحنی^{۱۷} (میلی متر در ثانیه)، سرعت در مسیر مستقیم

- 12. CASA (Computer Assisted Sperm Analysis)
- 13. Total motility (TM, %)
- 14. Progressive Motility (PM, %)
- 15. Average path velocity (VAP, $\mu\text{m/sec}$)
- 16. Curvilinear velocity (VCL, $\mu\text{m/sec}$)
- 17. Straight-line velocity (VSL, $\mu\text{m/sec}$)

- 18. Lateral head displacement (ALH, mm)
- 19. Beat-cross frequency (BCF, Hz)
- 20. Straightness (STR, %)
- 21. Linearity (LIN, %)

رنگی را ایجاد می‌کند. ابتدا پایوت‌ها یخ‌گشایی شدند. سپس اندازه‌گیری مالون دی‌آلدهید با حل کردن ۵۰۰ میکرولیتر نمونه در ۳ میلی‌لیتر اسید فسفریک ۱٪ آغاز می‌گردد. پس از ورتكس کردن به میزان ۱ میلی‌لیتر محلول تیوباربیتوریک اسید ۰/۷٪ به لوله آزمایش اضافه شده و پس از ورتكس کامل به مدت ۴۵ دقیقه در داخل یک بن ماری در حال جوش قرار داده می‌شود. پس از اتمام مدت لازم لوله‌های آزمایش را زیر آب سرد خنک کرده، به میزان ۳ میلی‌لیتر بوتانل نرمال اضافه نموده و به مدت ۱ الی ۲ دقیقه ورتكس نموده و سپس به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰ rpm سانتریفوژ نموده و پس از جدا کردن فاز آبی (محلول رویی) غلظت مالون دی‌آلدهید (MDA)، با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (PG T80 UV/VIS Instruments Ltd, UK) در طول موج ۵۳۲ نانومتر مورد سنجش قرار گرفت. در این تحقیق استانداردهای مالون دی‌آلدهید با استفاده از ۱ و ۰/۳ و ۰/۱ تتراتوتوكسی پروپان (C7H16O4) در پنج غلظت مختلف ۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۲، ۰/۴، ۰/۸ نانو مول در میلی‌لیتر با استفاده از حل کردن در آب دیونیزه تهیه و برای رسم منحنی استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.


0.5	1	2	4	8
0.01	0.03	0.05	0.09	0.21

منحنی استاندارد رسم شد. جذب به شکل زیر بود. سپس معادله رگرسیونی منحنی استاندارد محاسبه شد (نمودار ۱).

جدا، ضخیم بودن قطعه میانی، خمیدگی قطعه میانی، دم بریده، دم پیچ خورده) تعیین شد.

یکپارچگی غشای اسپرم: یکپارچگی غشای پلاسمایی با استفاده از تست التهاب هیپوآسموتیک^{۲۲}، بر پایه پیچش و تورم دم ارزیابی شد^(۱۵). این عمل با انکوباسیون ۱۰ میکرولیتر منی با ۱۰۰ میکرولیتر از یک محلول‌هایپوآسموتیک (فروکتوز ۹ گرم/لیتر+ سیترات سدیم ۴/۹ گرم/لیتر آب مقطر) در دمای ۳۷°C به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد. پس از انکوباسیون ۲۰۰ اسپرم بررسی شد و اسپرم‌های با دم پیچ خورده و متورم که به عنوان اسپرم‌های با غشای پلاسمایی سالم در نظر گرفته شدند، در هر نمونه در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ۴۰۰ ارزیابی شد.

ارزیابی تیوباربیتوریک اسید^{۲۳}: اساس روش اندازه گیری غلظت مالون دی‌آلدهید بر پایه واکنش با تیوباربیتوریک اسید، استخراج با بوتانل نرمال، اندازه گیری جذب باروش اسپکتروفوتومتری می‌باشد^(۱۴). واکنش باید در pH=۲-۳ در ۹۰-۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه انجام شود. در این شرایط ۱ مولکول مالون دی‌آلدهید با دو مولکول تیوباربیتوریک اسید واکنش داده و کمپلکس صورتی



کروموزن -۲ - (۴- یدوفنیل)-۳- (۴- نیتروفنول) -۵- فنیل تترازولیم کلرید^{۲۵} واکنش داده، تا رنگ ایجاد شود. میزان فعالیت آنزیم از طریق مهار این واکنش و جلوگیری از تشکیل رنگ قابل اندازه گیری است (۳۱). یک واحد سوپراکسید دیسموتاز مقداری از آنزیم است که در شرایط آزمایش، از ۵۰ درصد میزان واکنش تولید رنگ جلوگیری نماید. جذب در ۵۰۵ نانومتر با اسپکتوفوتومتر ثبت شد. فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به صورت U / میلی گرم پروتئین^{۲۶} گزارش گردید.

ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسمای منی: ظرفیت کل آنتی اکسیدانی با استفاده از کیت های تجاری شرکت رندوکس اندازه گیری شد. بر این اساس مایع منی در دمای C ۳۷ در مدت ۲۰ دقیقه یخ گشایی شد. سپس به منظور ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه ها، ABTS^{۲۷} با پراکسیداز و آب اکسیژنه^{۲۸} به منظور تولید

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز پلاسمای منی: برای اندازه گیری مقدار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، از کیت های تجاری شرکت رندوکس استفاده شد. گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از کیتومن هیدروپراکسید، اکسیداسیون گلوتاتیون را کاتالیز می کند. در حضور آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز و نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات^{۲۴}، شکل اکسید شده گلوتاتیون نیز به فرم گلوتاتیون احیا تبدیل می شود. همزمان با آن نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات، اکسید می شود. کاهش جذب نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات در ۲۴۰ نانومتر با اسپکتوفوتومتر اندازه گیری می شود که متناسب با غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است و به صورت IU / گرم پروتئین گزارش شده است.

ارزیابی سوپراکسید دیسموتاز پلاسمای منی: به منظور ارزیابی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز از کیت های تجاری رندوکس استفاده شد. با استفاده از گزانتین و آنزیم گزانتین اکسیداز رادیکال های آزاد سوپراکسید تولید شد. این رادیکال های آزاد سپس با

25. 2- (4 – iodophenyl) -3- (4- nitrophenol)-5- phenyltetrazoliumchloride (I.N.T)

26. International unit /miligram protein

27. ABTS® = 2,2'-Azino-di-[3-ethylbenzthiazoline sulphonate]

28. H₂O₂

24. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH)

در نظر گرفته شد. اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد گزارش شد. مدل آماری این طرح عبارت بود:

$$Y_{ij} = \mu + A_i + e_{ij} \quad \text{از:}$$

μ = داده مشاهده شده برای فراسنجه های اندازه گیری شده

A_i = میانگین جامعه

A_i = اثر تیمار آم

e_{ij} = اثر باقیمانده یا اشتباہ آزمایشی

کاتیون رادیکال ABTS⁺ انکوبه شد. این ترکیب دارای رنگ نسبتاً پایدار سبز آبی است و جذب نمونه ها در ۶۰۰ نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد (۳۸). آنتی اکسیدان های اضافه شده به نمونه تا درجه ای که متناسب با غلظت شان است از تشکیل این رنگ جلوگیری می کنند. مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل به صورت میلی مول در لیتر پروتئین در نمونه منی پلاسمما گزارش شد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از ارزیابی فراسنجه های حرکتی در جدول ۱ نشان داده شده است. درصد تحرک پیش رونده، سرعت در مسیر مستقیم و سرعت در مسیر منحنی اسپرم ها در دمای یخ گشایی ۳۷°C به مدت ۳۰ ثانیه به ۶۰°C به مدت ۶ ثانیه بهبود یافت و لی این افزایش از نظر آماری معنی داری نبود.

تحلیل آماری

این تحقیق با دو نرخ یخ گشایی و هر کدام با شش تکرار انجام شد. داده های حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفی و مدل آماری شامل اثر دما و زمان یخ گشایی بود. داده ها به کمک رویه GLM نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگین ها به روش توکی انجام گرفت. اثر تیمار به عنوان اثر ثابت

جدول ۱: ویژگی های دینامیکی تحرک پس از یخ گشایی با روش های متفاوت

Table 1. Dynamic motion characteristics after thawing with different methods

P-Value	SEM	روش های یخ گشایی		فراسنجه های حرکتی	
		60°C to 6 s	37°C to 30 s	Motion parameters	
0.2197	1.7	50.7	53.8	Total motility	تحرک کل (%)
0.2315	1.1	21.1	22.9	Progressive motility	تحرک پیش رونده (%)
0.4448	1.0	63.8	63.9	Average path velocity (μm/s)	میانگین سرعت در مسیر
0.3256	1.2	46.9	48.6	Straight-line velocity (μm/s)	سرعت در مسیر مستقیم
0.3818	2.5	106.3	109.4	Curvilinear velocity (μm/s)	سرعت در مسیر منحنی
0.7527	1.7	74.8	75.6	Straightness (%)	راستی مسیر طی شده (%)
0.9906	1.2	44.3	44.3	Linearity (%)	خطی بودن تحرک (%)
0.2448	0.3	8.1	7.6	Amplitude of lateral head displacement (μm)	تحرک عرضی سر
0.8508	0.7	16.8	17.0	Beat/cross frequency (Hz)	فرکانس حرکات

تحرک کل (TM)، تحرک پیش رونده (PM)، میانگین سرعت در مسیر (VAP)، سرعت در مسیر مستقیم (VSL)، سرعت در مسیر منحنی (VCL)، راستی مسیر طی شده (STR)، خطی بودن تحرک (ALH)، تحرک عرضی سر (LIN)، فرکانس حرکات جانی (BCF).

غشاء پلاسمایی اسپرم ها نیز در دمای یخ گشایی ۳۷°C به مدت ۳۰ ثانیه به ۶۰°C به مدت ۶ ثانیه بهتر بوده اما این افزایش معنی دار نبوده است. از نظر ریخت شناسی

افزایش دما و کاهش زمان یخ گشایی تأثیر مثبتی بر دیگر فراسنجه های حرکتی نداشت. با توجه به نتایج مندرج در نمودار ۱، درصد زنده مانی و یکپارچگی

دیسموتاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل نشان داد که بین دو نرخ یخ گشایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. (جدول ۲).

و میزان اسپرم های نابهنجار نرخ یخ گشایی بالا اثر معنی داری نسبت به یخ گشایی در دمای پایین تر نداشت (نمودار ۲).


نتایج حاصل از ارزیابی پراکسیداسیون لیپید، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید

جدول ۲: اثر دما و زمان یخ گشایی بر وضعیت اکسیداتیو در منی رقیق شده

Table 2. Effect of temperature and thawing time on Oxidative status of diluted semen.

P-Value	SEM	روش یخ گشایی		وضعیت اکسیداتیو Oxidative status
		60 °c to 6 s	37 °c to 30 s	
0.8601	2.5	43.4	42.8	گلوتاتیون پراکسیداز (IU/g protein)
0.6486	2	74.3	75.7	سوپر اکسید دیسموتاز (U/mg)
0.7730	0.1	1.5	1.5	ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (mmol/l)
0.7054	0.1	2.9	2.8	غلهظت مالون دی آلدید (nmol/ml)
				Malondialdehyde

آنژیم های گلوتاتیون پراکسیداز (GP-X)، سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) و غلهظت مالون دی آلدید (MDA) در سلول اسپرم.



نمودار ۲: اثر دما و زمان یخ گشایی بر زنده مانی، اسپرم های غیر طبیعی و یکپارچگی غشاء پلاسمایی اسپرم ها

Figure 1. Effect of Temperature and thawing time on viability, Abnormalities, and of memberan intrgrity sperm.

در این حالت، هنگام عبور سلول اسپرم از محدوده دمایی خطرناک، کریستال های یخ زمان لازم برای تشکیل را نخواهند داشت و بنابر این اسپرم به طور

یخ گشایی سریع منی باعث کاهش اثرات مضر فرایند کریستاله شدن و هیدراتاسیون شده و از آسیب به سیتوپلاسم و غشاء اسپرم جلوگیری می کند (۵۵).

سرعت در مسیر منحنی در دمای 37°C بهبود غیرمعنی داری داشت. همچنین سایر فراسنجه‌های حرکتی اسپرم در دمای بالاتر نسبت به دمای 37°C معنی دار نبودند. این نتایج مخالف با یافته‌های سایر محققان بود که بهبود فراسنجه‌های حرکتی اسپرم را در گونه گاو با یخ‌گشایی در دماهای بالاتر گزارش کردند (۲۸، ۵۳). با این حال دکا و رائو (۱۹۸۷)، به طور قابل توجهی تحرک پیش‌رونده بالاتری پس از ذوب منی بز با سرعت یخ‌گشایی 37°C به مدت ۱۵–۱۲ ثانیه نسبت به یخ‌گشایی آهسته در 5°C به مدت ۲ دقیقه به دست آوردند (۱۴). همچنین تعدادی از محققین گزارش کردند که تحرک اسپرم، سلامت آکروزوم و میزان زنده‌مانی سلول اسپرم، زمانی که پایوت‌ها در 70°C به مدت ۵ ثانیه یخ‌گشایی می‌شوند در مقایسه با یخ‌گشایی 37°C به مدت ۳۰ ثانیه و 50°C به مدت ۱۵ ثانیه به طور قابل توجهی بالاتر است (۳۹، ۳). جینودین و داس (۱۹۸۲)، میزان بالایی از تحرک و یکپارچگی آکروزوم را در منی گاومیش پس از یخ‌گشایی با سرعت 50°C در مقایسه با 5°C گزارش کردند (۲۳). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فراسنجه‌های تحرکی، زنده‌مانی و یکپارچگی غشاء پلاسمایی با غوطه‌ور شدن پایوت‌ها در حمام آب گرم با نرخ یخ‌گشایی 37°C به مدت ۳۰ ثانیه در مقایسه با نرخ یخ‌گشایی 60°C به مدت ۶ ثانیه بهبود یافت اما این افزایش معنی دار نبود. این نتایج موافق با نتایجی بود که تأثیر پتبریان و همکاران (۱۹۸۲) گزارش شد که تأثیر مثبتی از دمای یخ‌گشایی بر تحرک یا یکپارچگی آکروزوم اسپرم قوچ پس از یخ‌گشایی در 37°C به مدت ۲۰ ثانیه و دمای 60°C به مدت ۸ ثانیه با استفاده از پایوت‌های $0/5$ میلی لیتری پیدا نکردند (۴۴).

نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که میزان اسپرم‌های غیرطبیعی با یخ‌گشایی در 37°C به

مستقیم از حالت شیشه‌ای به حالت مایع متقل می‌شود (۴۳). در حال حاضر پایوت‌های حاوی منی قوچ در حمام آب گرم با دمای 38°C به مدت ۳۰–۱۲ ثانیه یخ‌گشایی می‌شوند؛ این روش منجر به نتایج خوبی ($36/1\%$ تحرک) در مقایسه با روش آهسته ($18/9\%$ تحرک) شده است که در آن پایوت‌ها در حمام آب گرم 5°C به مدت ۲ دقیقه یخ‌گشایی شده‌اند (۲۱). نتایج حاصل از یک بررسی نشان داد که دماهای بالاتر از $50-70^{\circ}\text{C}$ 5 زمان قرار گرفتن اسپرم در معرض آسیب کریستاله شدن و اسمزی را به حداقل می‌رساند (۲۵).

بررسی سالمون و ماسکول (۴۸) و اغلب محققین نشان داد که از دمای $38-42^{\circ}\text{C}$ و در برخی مطالعات 75°C برای یخ‌گشایی پایوت حاوی منی منجمد قوچ استفاده شده است (۱ و ۵). در برخی مطالعات منی را در 70°C یخ‌گشایی کردند (۴، ۱۲، ۲۰). همچنین در برخی بررسی‌ها یخ‌گشایی بالاتر از 60°C را گزارش کرده‌اند (۱۷ و ۱۸). سالیسیوری (۵۰) گزارش کرد که یخ‌گشایی باید با سرعت انجام شود زیرا یخ‌گشایی آهسته (5°C) باعث تشکیل کریستال یخ داخل سلولی شده و منجر به از هم گسیختگی غشاء پلاسمایی می‌شود. مطالعه بر روی اسپرم خوک نشان داد زمانی که پایوت‌ها در حمام آب گرم $70-80^{\circ}\text{C}$ نسبت به 40°C غوطه‌ور می‌شوند، اسپرماتوزوا به طور قابل توجهی از ناحیه بحرانی دما (-15°C – -60°C) سریع‌تر عبور می‌کند (۶، ۲۸). لازم به ذکر است که مدت زمان یخ‌گشایی منی باید کوتاه و دقیق باشد (۱۱)، این به ویژه در دمای بالا که در آن پرتوئین دناتوره می‌شود مهم است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن بیش از حد اسپرم در این دما باعث مرگ اسپرم می‌شود (۵۲).

در مطالعه حاضر فراسنجه‌های حرکتی اسپرم همچون تحرک پیش‌رونده، سرعت در مسیر مستقیم،

نیامد. تاکنون مقایسه اثر نرخ یخ‌گشایی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و ظرفیت تام آنتی-اکسیدانی در سلول‌های اسپرم و پلاسمای منی حیوانات انجام نشده است. در این تحقیق برای اولین بار این اثرات با دو نرخ یخ‌گشایی ارزیابی شد و هیچ تفاوت معناداری بین دو نرخ یخ‌گشایی مشاهده نشد. تولید رادیکال‌های آزاد در طی فرآیند انجماد-یخ-گشایی منجر به پراکسیداسیون لیپیدی غشاء اسپرم می‌شود (۱۳). لذا شاخص تولید مالوندی‌آلدهید به طور گسترده برای تعیین پراکسیداسیون لیپید در انواع سلول‌ها از جمله اسپرم استفاده می‌شود (۲۷). نایر و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند که مقدار مالوندی‌آلدهید تولید شده در اسپرم ارتباط منفی با تحرک و زنده‌مانی اسپرم دارد (۳۴). نجفی و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند که بین پراکسیداسیون لیپیدی و تحرک اسپرم ارتباط معنی‌داری وجود دارد (۳۵). در مطالعه حاضر نیز تفاوت قابل توجهی بین سطوح مالوندی‌آلدهید میان دو نرخ یخ‌گشایی مشاهده نشد که ظاهرا نشان می‌دهد نرخ یخ‌گشایی عامل اصلی تاثیر گذار بر LPO و به دنبال آن کیفیت اسپرم پس از یخ‌گشایی نیست. بنابر این احتمالاً نرخ تفاوت یخ‌گشایی در سیالیت غشاء پلاسمایی موثر نبوده و تاثیری بر حساسیت اسپرم نسبت به پراکسیداسیون لیپیدی ندارد.

نتیجه‌گیری کلی

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات نرخ یخ‌گشایی بر کیفیت پس از ذوب اسپرم قوچ طراحی شد. نتایج بیانگر این نکته می‌باشند که نرخ یخ‌گشایی 60°C به مدت ۶ ثانیه نتوانسته جایگزین مناسبی برای نرخ یخ-گشایی 37°C به مدت ۳۰ ثانیه باشد و تفاوت معنی‌داری بین دو نرخ یخ‌گشایی وجود ندارد. با این حال لازم است با انجام آزمایش‌های عملکردی، پروتکل‌های مختلف یخ‌گشایی به ویژه دماهای پایین‌تر از

مدت ۳۰ ثانیه بهبود یافته اما این افزایش معنی‌دار نبود که مخالف با نتایج سایر محققین بود (۵۷، ۴۶).
جیاندرن و همکاران (۱۹۸۴) گزارش کردند که توانایی دم اسپرم نسبت به تورم در یک محلول هایپوسموتیک نشان‌دهنده انتقال آب از غشاء به طور طبیعی است؛ یعنی نشان‌دهنده یکپارچگی و عملکرد طبیعی غشاء است (۲۴). در مطالعه حاضر نیز عدم تأثیر روش‌های انجماد بر درصد اسپرم‌های با دم متورم شده موافق با نتایج سایر محققین بود (۵۴).
سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیدیسموتاز به عنوان مکانیسم دفاعی در برابر پراکسیداسیون لیپیدی مایع منی انسان و گونه‌های متعدد حیوانی شناخته شده‌اند که در حفظ تحرک و زنده‌مانی اسپرم مهم هستند (۱۹، ۵۶ و ۵۹). اختلال در سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی منی فریز شده پستانداران ممکن است ناشی از حذف یا رقت بالای پلاسمای در طی فرآیند انجماد و یخ‌گشایی باشد (۱۰).
لسو و همکاران (۱۹۹۴)، دریافتند فعالیت سوپراکسید دیسموتاز نمونه اسپرم انسان پس از فرایند انجماد پایین تر از نمونه اسپرم تازه است (۲۶). این مطالعات نشان می‌دهد که از دست دادن بخشی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در غشاء پلاسمایی سلول‌های آسیب‌دیده اسپرم باعث مستعد شدن اسپرم به آسیب پراکسیداسیون پس از یخ‌گشایی می‌شود. در مطالعه حاضر اثر مقایسه دو نرخ یخ‌گشایی بر روی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بررسی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین دو نرخ یخ‌گشایی بر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز وجود ندارد. همچنین نشان داده شده است که ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی منی، با قدرت تحمل اسپرم در طی انجماد مرتبط است (۸). در مطالعه حاضر تفاوت معنی‌داری بین دو نرخ یخ-گشایی در ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی منی به دست

۶۰°C بیشتر بررسی شده و تاثیر آن بر باروری قوچ ارزیابی شود.

منابع

- Rodriguez-Martinez, H., and Roca, J. 2015. High total antioxidant capacity of the porcine seminal plasma (SP-TAC) relates to sperm survival and fertility. *Sci. Rep.* 5: 18538.
10. Barranco, I., Tvarijonaviciute, A., Perez-Patiño, C., Parrilla, I., Ceron, J.J., Martinez, E.A., Rodriguez-Martinez, H., and Roca, J. 2015. High total antioxidant capacity of the porcine seminal plasma (SP-TAC) relates to sperm survival and fertility. *Sci. Rep.* 5: 18538.
11. Bearden, H. J., and Fuquay, J.W., Applied animal reproduction, Reston Publishing Company, Inc. 1980. Reston Publishing Company, Inc, Reston, Virginia. 337 .
12. Bilodeau, J.F., Chatterjee, S., Sirard, M.A., and Gagnon, C. 2000. Levels of antioxidant defenses are decreased in bovine spermatozoa after a cycle of freezing and thawing. *Mol Reprod Dev.* 55(3): 282-288.
13. Blackshaw, B.A. 1955. Factors affecting the revival of bull and ram spermatozoa after freezing to—79 C. *J. Aust Vet.* 31: 238-241.
14. Borah, B.K.D., Deka, B.C., Biswas, R.K., Chakravarty, P., Deori, S., Sinha, S., and Ahmed, K. 2015. Effect of thawing methods on frozen semen quality of yak (*Poephagus grunniens* L.) bulls. *Vet World.* 8 (7): 831.
15. Chatterjee, S., and Gagnon, C. 2001. Production of reactive oxygen species by spermatozoa undergoing cooling, freezing, and thawing. *Mol Reprod Dev.* 59: 451-458.
16. Dandekar, S.P., Nadkarni, G.D., Kulkarni, V.S., and Punekar, S. 2002. Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in male infertility. *J. Postgraduate Medicine.* 48(3): 186.
17. Deka, B., and Rao, A. 1987. Effect of extenders and thawing methods on post thawing preservation of goat semen. *Vet World.* 64: 591-594.
18. Dodaran, H.V., Zhandi, M., Sharafi, M., Nejati-Amiri, E., Nejati-Javaremi, A., Mohammadi-Sangcheshmeh, A., Shehab-El, M.A., and Shakeri, M. 2015 . Effect of ethanol induced mild stress on
1. Aamdal, J., and Andersen, K. 1968. Freezing of ram semen in straws. *Int Congr Anim Reprod Artif Insemination. Anim Reprod Sci,* Paris, France. 977-980.
2. Aboagla, E.M.E., and Terada, T. 2004. Effects of egg yolk during the freezing step of cryopreservation on the viability of goat spermatozoa. *J. Theriogenology.* 62: 1160-1172.
3. Ahmad, K., 1984. Effect of thaw rates on survival of buffalo spermatozoa frozen in straws. *J. Dairy. Sci.* 67: 1535-1538.
4. Andersen, K., and Aamdal, J. 1972. Artificial insemination with frozen semen in sheep in Norway. *Reprod Domest Anim.* 26:27–30.
5. Andersen, V.K., Aamdal, J., and Fougner, J. 1973. Intrauterine and deep cervical insemination with frozen semen in sheep. *Reprod Domest Anim.* 8: 113-118.
6. Athurupana, R., Ioki, S., and Funahashi, H. 2015. Rapid thawing and stabilizing procedure improve postthaw survival and in vitro penetrability of boar spermatozoa cryopreserved with a glycerol-free trehalose-based extender. *J. Theriogenology.* 84(6): 940-947.
7. Athurupana, R., Ioki, S., and Funahashi, H. 2015. Rapid thawing and stabilizing procedure improve post-thaw survival and in vitro penetrability of boar spermatozoa cryopreserved with a trehalose-based extender. *J. Reprod Dev.* 61: 205–10.
8. Barranco, I., Tvarijonaviciute, A., Perez-Patiño, C., Parrilla, I., Ceron, J.J., Martinez, E.A., Rodriguez-Martinez, H. and Roca, J. 2015. High total antioxidant capacity of the porcine seminal plasma (SP-TAC) relates to sperm survival and fertility. *Sci. Rep.* 5: 18538.
9. Bearden, H.J., Barranco, I., Tvarijonaviciute, A., Perez-Patiño, C., Parrilla, I., Ceron, J.J., Martinez, E.A.,

- the functional integrity of the human sperm membrane and its relationship to other semen characteristics. *J. Reprod Fertil.* 70: 1.219-228.
28. Knox, R., Ringwelski, J., McNamara, K., Aardsma, M., and Bojko, M. 2015. The effect of extender, method of thawing, and duration of storage on in vitro fertility measures of frozen-thawed boar sperm. *J. Theriogenology.* 84: 407-412.
29. Lasso, J.L., Noiles, E.E., Alvarez, J.G., and Storey, B.T. 1994. Mechanism of superoxide dismutase loss from human sperm cells during cryopreservation. *Int J. Androl.* 15: 255-265.
30. Lector, C. 1996. Oxidative stress and role of antioxidants in normal and abnormal sperm function. *Front Biosci.* 1: 78-86.
31. Lyashenko, A. 2015. Effect of different thawing procedures on the quality and fertility of the bull spermatozoa. *Asian. Pac. J. Reprod.* 4: 17-21.
32. Marshall, C. 1984. Considerations for cryopreservation of semen. *Z Biol.* 3: 343-356.
33. Masoudi, R., Shahneh, A.Z., Towhidi, A., Kohram, H., Akbarisharif, A., Sharafi, M., Zhandi, M., and Shahab-El-Deen, M. 2017. Cervical dilation and improvement of reproductive performance in fat-tailed ewes via cervical dilator treatments. *Asian. Pac. J. Reprod.* 6: 93.
34. Mazur, P. 1985. Basic concepts in freezing cells. Deep freezing of boar semen. Uppsala, Sweden. *Agric. Sci.* 37-60.
35. Mehdipour, M., Daghikh Kia, H., Nazari, M., and Najafi, A. 2017. Effect of lecithin nanoliposome or soybean lecithin supplemented by pomegranate extract on post-thaw flow cytometric, microscopic and oxidative parameters in ram semen. *J. Cryobiology.* 78: 34-40.
36. Mehdipour, M., Daghikh Kia, H., Najafi, A., Dodaran, H.V., and García-Alvarez, O. 2016. Effect of green tea (*Camellia sinensis*) extract and pre-freezing equilibration time on the post-thawing quality of ram semen cryopreserved in a soybean lecithin-
- post-thawed bull sperm quality. *J. Cryobiology.* 71: 12-17.
19. Eriksson, B.M., and Rodriguez-Martinez, H. 2000. Effect of freezing and thawing rates on the post-thaw viability of boar spermatozoa frozen in FlatPacks and Maxi-straws. *Anim Reprod Sci.* 63: 205-220.
20. Fiser, P., and Fairfull, R. 1989. The effect of glycerol-related osmotic changes on post-thaw motility and acrosomal integrity of ram spermatozoa. *J. Cryobiology.* 26: 64-69.
21. Fiser, P., Ainsworth, L., and Fairfull, R. 1987. Evaluation of a new diluent and different processing procedures for cryopreservation of ram semen. *J. Theriogenology.* 28: 599-607.
22. Gadea, J., Sellés, E., Marco, M.A., Coy, P., Matás, C., Romar, R., and Ruiz, S. 2004. Decrease in glutathione content in boar sperm after cryopreservation: Effect of the addition of reduced glutathione to the freezing and thawing extenders. *J. Theriogenology.* 62: 690-701.
23. Grøtte, O., Graffer, T. and Olesen, I., Artificial insemination with frozen ram semen in Norway, Proc. 12th Int. Congr. Anim Reprod, 1992, pp. 1557-1559.
24. Hashemi, A., Farhoomand, P., Pirmohammadi, R., Nayebpor, M., and Razzaghzadeh, S. 2007. Effect of extender and thawing methods on post thawing preservation. *J. Anim. Vet Adv.* 6: 1337-1339.
25. Holt, W., Head, M., and North, R. 1992. Freeze-induced membrane damage in ram spermatozoa is manifested after thawing: observations with experimental cryomicroscopy. *Biol Reprod.* 46: 1086-1094.
26. Jainudeen, M., and Das, S. 1982. Effect of level of glycerol, rates of freezing and thawing on the survival of buffalo spermatozoa in straws. Asian-Australas J. Anim. Sci. Serdang, Malaysia. Penerbit University, Kuala Lumpur, Malaysia. 409-411.
27. Jeyendran, R., Van der Ven, H., Perez-Pelaez, M., Crabo, B., and Zaneveld, L. 1984. Development of an assay to assess

- different thawing procedures for ram semen frozen in minitubes and mini straws. *Theriogenology.* 61: 9.1719-1727.
45. Peña, A., and Linde-Forsberg, C. 2000. Effects of Equex, one-or two-step dilution, and two freezing and thawing rates on post-thaw survival of dog spermatozoa. *J. Theriogenology.* 54: 859-875.
46. Perry, E.J. 1955. Artificial insemination of farm animals, Rutgers University Press: NB. 368.
47. Pontbriand, D., Howard, J., Schiewe, M., Stuart, L., and Wildt, D. 1989. Effect of cryoprotective diluent and method of freeze-thawing on survival and acrosomal integrity of ram spermatozoa. *J. Cryobiology.* 26: 341-354.
48. Rastegarnia, A., Shahverdi, A., Topraggaleh, T.R., Ebrahimi, B., and Shafipour, V. 2013. Effect of different thawing rates on post-thaw viability, kinematic parameters and chromatin structure of buffalo (*bubalus bubalis*) spermatozoa. *J. Cell (Yakhteh).* 14: 306.
49. Rijsselaere, T., Pope, E., Wirtu, G., Filliers, M., Maes, D., Dresser, B., and Van Soom, A. 2007. Effect of thawing temperature on survival of cooled, cryopreserved epididymal cat spermatozoa, Proceedings of the 16th Congresso Nacional and the 5th Annual Symposium of EVSSAR (Estoril, Portugal). 106-106.
50. Robbins, R., Saacke, R., and Chandler, P. 1976. Influence of freeze rate, thaw rate and glycerol level on acrosomal retention and survival of bovine spermatozoa frozen in French straws. *J. Anim. Sci.* 42: 145-154.
51. Salamon, S., and Maxwell, W.M.C. 1995. Frozen storage of ram semen I. Processing, freezing, thawing and fertility after cervical insemination. *J. Anim. Sci.* 37: 185-249.
52. Salamon, S., and Maxwell, W. 2000. Storage of ram semen. *J. Anim. Sci.* 62: 77-111.
53. Salisbury, G.W., VanDemark, N., and Lodge, J.R., 1978. Physiology of reproduction and artificial insemination based extender. *J. Cryobiology.* 73: 297-303.
37. Nair, S.J., Brar, A., Ahuja, C., Sangha, S., and Chaudhary, K. 2006. A comparative study on lipid peroxidation, activities of antioxidant enzymes and viability of cattle and buffalo bull spermatozoa during storage at refrigeration temperature. *Anim Reprod Sci.* 96: 1-2.21-29.
38. Najafi, A., Daghighe Kia, H., Mohammadi, H., Najafi, M.H., Zanganeh, Z., Sharifi, M., Martinez-Pastor, F. and Adeldust, H. 2014. Different concentrations of cysteamine and ergothioneine improve microscopic and oxidative parameters in ram semen frozen with a soybean lecithin extender. *Cryobiology.* 69: 1.68-73.
39. Najafi, A., Najafi, M., Zanganeh, Z., Sharifi, M., Martinez- Pastor, F. and Adeldust, H. 2014. Cryopreservation of ram semen in extenders containing soybean lecithin as cryoprotectant and hyaluronic acid as antioxidant. *Reprod Domest Anim.* 49: 6.934-940.
40. Najafi, D., Taheri, R.A., Najafi, A., Rouhollahi, A.A. and Alvarez-Rodriguez, M. 2018. Effect of Achillea millefolium-loaded nanophytosome in the post-thawing sperm quality and oxidative status of rooster semen. *Cryobiology.* 69: 1.68-73.
41. Nur, Z., Ileri, I.K. and Ak, K. 2006. Effects of different temperature treatments applied to deep stored bull semen on post-thaw cold shocked spermatozoa. *B Vet Ipulawy.* 50: 1.79.
42. Nur, Z., Segirkaya, H., Dogan, I., Soylu, M., Ak, K. and Ileri, I. 2005. Effect of low temperature thawing procedure and post-thaw cold shock on frozen bull semen. *Med Weter.* 9: 61.
43. Ollero, M., Perez-Pe, R., Muino-Blanco, T. and Cebrian-Perez, J. 1998. Improvement of ram sperm cryopreservation protocols assessed by sperm quality parameters and heterogeneity analysis. *Cryobiology.* 37: 1.1-12.
44. Paulenz, H., Söderquist, L., Ådnøy, T., Nordstoga, A., Gulbrandsen, B. and Berg, K.A. 2004. Fertility results after

- post-thawed motility and fertility of cryopreserved buffalo spermatozoa. *J. Anim. Sci.* 67: 69-77.
59. Surai, P., Blesbois, E., Grasseau, I., Chalah, T., Brillard, J.-P., Wishart, G., Cerolini, S., and Sparks, N. 1998. Fatty acid composition, glutathione peroxidase and superoxide dismutase activity and total antioxidant activity of avian semen. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Bio. Mol. Educ.* 120: 527-533.
60. Vazquez, J., Martinez, E., Martinez, P., Garcia-Artiga, C., and Roca, J. 1997. Hypoosmotic swelling of boar spermatozoa compared to other methods for analysing the sperm membrane. *J. Theriogenology.* 47: 913-922.
61. Verma, A., and Kanwar, K. 1999. Effect of vitamin E on human sperm motility and lipid peroxidation in vitro. *Asian. J. Androl.* 1: 151-154..
62. Wai-Sum, O., Chen, H., and Chow, P. 2006. Male genital tract antioxidant enzymes—their ability to preserve sperm DNA integrity. *Mol Cell Endocrinol.* 250: 80-83.
- of cattle. WH Freeman and Company. No.Ed. 798 .
54. Sarangi, A., Verma, A., Patel, R.N., Rath, A.P., Sahu, S., Virmani, M., and Devi, P. 2018. Vitamin E and Gluthathion as Antioxidant in Liquid Preservation of Semen: A Review. *Int. J. Curr Microbiol. App. Sci.* 7: 1680-1684.
55. Sawyer, D.E., Mercer, B.G., Wiklundt, A.M., and Aitken, R.J. 2003. Quantitative analysis of gene-specific DNA damage in human spermatozoa. *Mutat. Res.* 529: 21-34.
56. Shah, S., Andrabi, S., and Qureshi, I. 2016. Effect of equilibration times, freezing, and thawing rates on post-thaw quality of buffalo (*Bubalus bubalis*) bull spermatozoa. *J. Andrology.* 4: 972-976.
57. Söderquist, L., Madrid-Bury, N., and Rodriguez-Martinez, H. 1997. Assessment of ram sperm membrane integrity following different thawing procedures. *J. Theriogenology.* 48: 1115-1125.
58. Sukhato, P., Thongsodseang, S., Utha, A., and Songsasen, N. 2001. Effects of cooling and warming conditions on



Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources

J. of Ruminant Research, Vol. 6(2), 2018

<http://ejrr.gau.ac.ir>

Effect of different thawing procedures on frozen semen quality of Ghezel rams

S. Vatankhah¹, *H. Daghigh Kia², G. Moghaddam² and M. Ebrahimi³

¹M.Sc. Gratuuated, ²Professor, and ³Assistant Prof., Dept. of Animal Science, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz, Tabriz, Iran

Received: 22/03/2018; Accepted: 09/09/2018

Abstract

Background and objectives: Today, artificial insemination has a special place in improving production efficiency and improving genetic progress. In order to realize many of the potential benefits of artificial insemination, semen storage for a long-term is considered a necessary step by freezing process. The freezing process, including the thawing process, leads to morphological changes, damage to the natural functions of the sperm and ultimately reduced fertility. Therefore, improving the thawing method of ram semen is related to the sperm quality indicators and is of considerable importance. The purpose of this study was to compare the effects of two thawing procedures on microscopic parameters, activity of Glutathione peroxidase and Superoxidase dismutase enzymes, and total antioxidant capacity of ram semen after freeze-thawing process.

Materials and methods: In this study, semen samples were collected from five Ghezel ram (3 and 4 years of age), during the breeding season, using an artificial vagina twice a week. To eliminate the individual effects of animals, semen samples were pooled after each sampling. Then diluted with Tris diluents having 1.5% soyben lecetin and 7% glycerol. The diluted semen's were filled at 0.25 ml straw and frozen in nitrogen vapor and stored in a tank containing liquid nitrogen until evaluation. The straws were thawed at water bath temperatures at (i) 37°C for 30 s and (ii) 60°C for 6 s. Following the freeze-thawing process, the effects of time exposure and thawing temperature on the kinematic features (CASA), viability, plasma membrane integrity, morphological abnormalities, malondialdehyde concentration, antioxidant activity, and total antioxidant capacity were evaluated. The experiment was conducted as a completely randomized and the statistical model includes the effect of temperature and thawing time. The data were analyzed by the general linear model (GLM) procedure and statistical differences between the various groups means were determined by Tukey's test. Significant differences were reported at the level of ($P<0.05$).

Results: The results showed that sperm motility parameters such as progressive motility, straight-line velocity, and curvilinear velocity at 37°C to 60°C were not statistically significant difference, but, there were some changes in terms of numbers. The viability and plasma membrane integrity at 37°C for 30 s compared 60°C for 6 s were positively changed numerically, but it was no significant. Also, total abnormality did not improve at high thawing rates than low rates. In addition, the results of the comparison of lipid peroxidation, glutathione peroxidase, superoxide dismutase and total antioxidant capacity were no significant at two thawing procedures.

Conclusion: According to the results obtained from thawing methods, the motility index, viability, and oxidative status at thawing rate 60°C for 6 s cannot be a suitable alternative for semen thawing at 37°C for 30 seconds.

Keywords: Thawing rates, Quality parameters, Frozen semen, Ram

*Corresponding Author: daghighkia@tabrizu.ac.ir

