

The effects of feeding formaldehyde-treated canola meal in two levels of dietary crude protein on dry matter intake, milk yield and composition, nutrients digestibility, and ruminal parameters in lactating goats

Mohammad Amin Tajaddini¹, Omid Dayani^{2*}, Amin Khezri³, Reza Tahmasbi³,
Mohammad Mehdi Sharifi-Hoseini⁴

¹ M.Sc. Graduate, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

² Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran, Email: odayani@uk.ac.ir

³ Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

⁴ Assistant Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Article Info	ABSTRACT
Article type: Research Full Paper	Background and Objectives: Due to the relative cost and dependence of the country on soybean meal importation, more attention is given to new protein sources such as canola meal as a suitable alternative for soybean meal. Also, the high protein degradability of meals in the rumen leads to the loss of nitrogen (urea) through urine. Thus, meal processing methods are considered in order to reduce the rate of ruminal protein degradation and increase by-pass protein proportion which can improve animal productive performance and efficiency of nitrogen utilization. Therefore, the effects of substituting formaldehyde-treated canola meal (0.8 and 1.2% of meal crude protein) for the untreated meal on feed intake, nutrient digestibility, productive performance, and some ruminal parameters in lactating goat's diet, and the possibility to compensate dietary protein deficiency using processed meal with 1.2% formaldehyde was investigated in this study.
Article history: Received: 02/08/2022 Revised: 03/14/2022 Accepted: 03/15/2022	
Keywords: Canola meal, Formaldehyde Lactating goats Milk yield and composition	

Materials and Methods: Eight multiparous lactating goats with an initial milk yield of 650-700 g/d were used in this study. Canola meal was treated with formaldehyde at two levels of 0.8 and 1.2% CP of the meal and then used in the concentrate mixture. Four dietary treatments were: (1) control diet with 14.5 % CP containing untreated canola meal, (2) diet with 14.5 % CP containing formaldehyde-treated canola meal (0.8% CP), (3) diet with 14.5 % CP containing formaldehyde-treated canola meal (1.2% CP), and (4) diet with 12.5 % CP containing formaldehyde-treated canola meal (1.2% CP). In the last 7 days of each experimental period, feed intake and milk yield were measured daily and a subsample of produced milk was collected for milk component analysis. On the last day of each collection period, ruminal fluid samples were taken from goats to measure pH, NH3-N concentration, and protozoa population count. The gross profit of milk production and economic estimation of experimental diets were also performed.

Results: The DM intake of the goats was significantly increased by the substitution of formaldehyde-treated canola meal in the diet ($P<0.05$). Reducing the dietary level of CP had also the same effect. Feeding 1.2 % formaldehyde-treated canola meal alone or with the reduced CP level of diet significantly increased the production of milk, FCM, fat, protein, and lactose ($P<0.05$), while experimental diets did not affect the milk

composition of the goats. Treating canola meal with formaldehyde did not affect ruminal pH, total protozoa, *Entodiniomorph*, *Holotrich*, and *Cellulolytic* count, while NH₃-N showed a significant decrease by feeding 1.2% formaldehyde-treated canola meal at 3 h post-feeding ($P<0.05$). Mean daily feed cost increased by feeding the formaldehyde-treated canola meal and daily gross profit was higher with the group that fed on a diet containing 1.2% formaldehyde-treated canola meal.

Conclusion: According to the present results, formaldehyde treatment of canola meal (1.2 %) enhanced the feed intake and growth performance of lactating goats, moreover, treatment at this level properly compensated for the probable adverse effects of the lack of dietary crude protein on animal performance. Therefore, formaldehyde treatment of canola meal (1.2 %) is recommended as a suitable choice to increase dietary bypass protein and positively impact growth performance, also to reduce the loss of nitrogen from the body.

Cite this article: Tajaddini, M.A., Dayani, O., Khezri, A., Tahmasbi, R., Sharifi-Hoseini, M.M. (2022). The effects of feeding formaldehyde-treated canola meal in two levels of dietary crude protein on dry matter intake, milk yield and composition, nutrients digestibility, and ruminal parameters in lactating goats. *Journal of Ruminant Research*, 10 (4), 21-38.



© The Author(s).

DOI: 10.22069/ejrr.2022.19898.1834

Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

پژوهش در نشخوار کنندگان

شایا چایی: ۲۳۴۵-۴۲۶۱
شایا الکترونیکی: ۲۳۴۵-۴۲۵۳



دانشگاه علم و تکنولوژی شهرضا

تأثیر تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدهید در دو سطح پروتئین خام بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های شکمبه‌ای در بزهای شیرده

محمدامین تاج‌الدینی^۱، امید دیانی^{۲*}، امین خضری^۳، رضا طهماسبی^۳، محمدمهدی شریفی‌حسینی^۴

^۱فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

^۲استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، رایانه‌ای: odayani@uk.ac.ir

^۳دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

^۴استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

اطلاعات مقاله چکیده

نوع مقاله:	مقاله کامل علمی - پژوهشی
ساخته و هدف:	به‌واسطه گرانی نسبی و وابستگی کشور به واردات کنجاله سویا و نیز با افزایش تقاضا برای منابع پروتئینی جدید، استفاده از منابع پروتئینی گیاهی مانند کنجاله کانولا به عنوان جایگزین مناسبی برای آن مورد توجه است. با توجه به تجزیه‌پذیری بالای پروتئین کنجاله‌ها و اتلاف نیتروژن به شکل اوره از طریق ادار، استفاده از روش‌های فرآوری کنجاله‌ها، به‌منظور کاهش نرخ تجزیه‌پذیری پروتئین و افزایش سهم پروتئین عبوری می‌تواند سبب بهبود عملکرد دام و راندمان استفاده از نیتروژن شود. در نتیجه، اثر جایگزینی کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدهید با کنجاله فرآوری شده در جیره بزهای شیرده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه‌های شکمبه‌ای، و امکان جبران کمبود پروتئین جیره با استفاده از کنجاله فرآوری شده با فرمالدهید در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
واژه‌های کلیدی:	واژه‌های کلیدی: آنژیم قارچی، الیاف نامحلول در شوینده، خشی کوارش ناپذیر، تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای، محصولات فرعی زراعی
تاریخ دریافت:	۱۴۰۰/۱۱/۹
تاریخ ویرایش:	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
تاریخ پذیرش:	۱۴۰۰/۱۲/۲۴

آنژیم قارچی	مواد و روش‌ها: در این پژوهش از هشت رأس بز بالغ شیرده (میانگین سن چهار سال، سه شکم زایش به بالا) نزد رایینی با میانگین تولید شیر اولیه ۷۰۰-۵۰۰ گرم در روز استفاده شد. پس از تعیین پروتئین خام، کنجاله کانولا با سطوح ۰/۸ و ۱/۲ درصد فرمالدهید (به‌ازای مقدار پروتئین خام کنجاله) فرآوری و در تهیه جیره استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل: (۱) جیره شاهد، دارای کنجاله فرآوری شده و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام، (۲) جیره دارای کنجاله فرآوری شده با ۰/۸ درصد فرمالدهید و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام، (۳) جیره دارای کنجاله فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدهید و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام. در روز آخر هر دوره نمونه‌گیری از مایع شکمبه به‌منظور تعیین pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و شمارش جمعیت پروتزوآنیجات انجام شد. همچنین هزینه تمام شده شیر، سود ناخالص از تولید شیر و برآورد اقتصادی جیره‌های آزمایشی بررسی شد.
-------------	---

یافته‌ها: فرآوری تأثیری بر درصد پروتئین خام کنجاله کانولا نداشت در حالی که میزان تجزیه‌پذیری پروتئین خام کنجاله را کاهش داد ($P < 0.05$). مصرف ماده خشک بزها با تغذیه کنجاله کانولا فرآوری شده افزایش یافت ($P < 0.05$), اما با کاهش سطح پروتئین خام جیره تغییری نکرد. همچنین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده‌خششی، پروتئین خام و چربی خام بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت. با تغذیه کنجاله کانولا فرآوری شده با $1/2$ درصد، تولید روزانه شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس 4 درصد چربی افزایش یافت ($P < 0.05$) و کاهش سطح پروتئین خام جیره، سبب افت تولید شیر بزها نشد. تغذیه جیره‌های آزمایشی بر درصد ترکیبات شیر بزها تأثیری نداشت، با این حال تولید روزانه چربی، پروتئین، لاکتوز به طور معنی‌داری با تغذیه کنجاله کانولا فرآوری شده با $1/2$ درصد فرمالدھید در جیره‌های با سطوح $1/4$ و $1/2$ درصد پروتئین خام جیره افزایش یافت. همچنین تفاوتی در pH مایع شکمبه، جمعیت گونه‌های هلوتریش، سلولولیتیک و انتودینیومورف‌ها و کل پروتزوآی مایع شکمبه بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد، اما غاظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بزها با تغذیه کنجاله کانولا فرآوری شده با $1/2$ درصد فرمالدھید کاهش یافت ($P < 0.05$). میانگین هزینه روزانه خوارک مصرفی بزها در گروه‌های تغذیه شده با کنجاله کانولا فرآوری شده افزایش یافت، سود ناخالص حاصل از تولید شیر در گروه‌های تغذیه شده با کنجاله کانولا فرآوری شده با $1/2$ درصد فرمالدھید بالاتر بود ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد فرآوری کنجاله کانولا با $1/2$ درصد فرمالدھید سبب بهبود مصرف خوارک و عملکرد تولیدی بزهای شیرده شد، همچنین فرآوری در این سطح به خوبی اثرات احتمالی کمبود پروتئین خام جیره را جبران کرده و عملکرد کلی بزها با کاهش سطح پروتئین خام نسبت به جیره شاهد (با پروتئین بالاتر) برابر شد. در نتیجه، فرآوری کنجاله کانولا با $1/2$ درصد فرمالدھید راهکاری مفید جهت افزایش سطح پروتئین عبوری جیره و بهبود عملکرد تولیدی، همچنین کاهش اتلاف نیتروژن از بدن به نظر می‌رسد.

استناد: تاج‌الدینی، م.ا.، دیانی، ا.، خضری، ا.، طهماسبی، ر.، ریفی‌حسینی، م.م. (۱۴۰۱). تأثیر تغذیه کنجاله کانولا فرآوری شده با فرمالدھید در دو سطح پروتئین خام بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های شکمبه‌ای در بزهای شیرده. پژوهش در نسخه‌وارکنندگان، ۱۰ (۴)، ۳۸-۲۱.

DOI: 10.22069/ejrr.2022.19898.1834



© نویسنده‌گان.

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شکمبه گزارش شده (Chaturvedi و Walli، ۲۰۰۱) و Eghbali و همکاران، (۲۰۱۱) که اثرات مثبت آن بر عملکرد تولیدی حیوان از جمله رشد (White و Mishra و همکاران، ۲۰۰۴)، تولید شیر (Bhatt و Sirohi و همکاران، ۲۰۱۳) و گوشت (Bhatt و Sahoo، ۲۰۱۹) در مطالعات مشاهده شده است (Gulati و همکاران، ۲۰۰۵). علی‌رغم این که کنجاله‌ها و مکمل‌های پروتئینی از اقلام گران قیمت جیره دام می‌باشند، مسئله نگران‌کننده دیگر در سطح جهانی در مورد نشخوارکنندگان آلودگی‌های محیطی ناشی از اتلاف نیتروژن توسط این دام‌هاست. تلاش برای افزایش بهره‌وری استفاده از پروتئین و کاهش استفاده از مکمل‌های پروتئینی در جیره، بدون اثر منفی بر عملکرد تولیدی حیوان از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد (Uwizeye و همکاران، ۲۰۲۰) که اثرات مثبت زیست-محیطی در کنار افزایش سود اقتصادی مزارع را در بر دارد (Rotz و همکاران، ۱۹۹۹). با توجه به محدود بودن مطالعات در رابطه با اثرات فرآوری کنجاله‌های پروتئینی با فرمالدھید در سطوح مختلف پروتئین خام جیره، در این پژوهش اثر جایگزینی کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید در سطوح ۰/۸ و ۱/۲ درصد پروتئین خام کنجاله با کنجاله فرآوری نشده در جیره بزهای شیرده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه‌های شکمبه‌ای و امکان جبران کمبود پروتئین جیره با استفاده از کنجاله فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

حیوانات و جیره‌های آزمایشی: این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دام سبک بخش مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. به این منظور از هشت رأس بز بالغ شیرده (در ابتدای دوره شیردهی)

مقدمه

امروزه، افزایش روزافروزن تولید مواد خوراکی با استفاده از پروتئین حیوانی، صنعت دامپروری را به یکی از مصرف‌کنندگان اصلی نیتروژن و ترکیبات پروتئینی در بخش کشاورزی در سراسر جهان تبدیل کرده است. استفاده بیش از حد از منابع پروتئینی در خوراک دام که در اکثر موارد با بازده پایینی توسط میکرووارگانیسم‌های شکمبه و یا بافت‌های بدن حیوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، معضل اصلی در این رابطه می‌باشد که منجر به انتشار مقدار زیادی نیتروژن و درنتیجه آلودگی منابع مختلف زیست-محیطی و به دنبال آن اثرات منفی بر سلامت انسان می‌شود (FAO، ۲۰۲۰؛ Sirohi و همکاران، ۲۰۱۳). پروتئین قابل تجزیه در شکمبه سهم عمده‌ای (۶۰ تا ۷۰ درصد) از ترکیب پروتئین کنجاله‌های دانه‌های روغنی را تشکیل داده است؛ و مصرف این کنجاله‌های پروتئینی در نشخوارکنندگان سبب تولید مقادیر زیادی آمونیاک در شکمبه می‌شود که سهم قابل توجهی از آمونیاک منتشرشده از دیواره شکمبه جذب شده و با تبدیل به اوره در کبد، از طریق ادرار از بدن دفع می‌شود (De Campeneere و همکاران، ۲۰۱۰). در حالیکه منابع پروتئینی با نرخ تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پایین به نحو کارآمدتری مورد استفاده قرار می‌گیرند (Mishra و همکاران، ۱۹۹۵). (۲۰۱۸).

در نشخوارکنندگان، فرآوری کنجاله‌ها بر نرخ تجزیه‌پذیری و قابلیت هضم پروتئین مؤثر است (McKinon و همکاران، ۱۹۹۵). روش‌های فرآوری کنجاله‌ها به‌طورکلی بر پایه روش‌های فیزیکی (برشته کردن، پرتودهی و غیره)، شیمیایی (با اسید، تانن، فرمالدھید و غیره) و بیولوژیک (میکروبی) می‌باشد (Chatterjee، ۱۹۹۸). از میان روش‌های مختلف، روش شیمیایی فرآوری با فرمالدھید از مؤثرترین روش‌های فرآوری به‌منظور افزایش پروتئین عبوری از

درصد وزن کنجاله) رقیق و روی کنجاله اسپری شد، برای ۱۵ دقیقه به طور کامل هم زده شد و به مدت ۴۸ ساعت درون کیسه‌های نایلونی سیلو شد. پس از این مدت کنجاله در محیط سایه، سه روز خشک شد و سپس برای تهیه جیره‌های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت (Hadjipanayiotou, ۱۹۹۲). برای تعیین فرانسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین خام کنجاله کانولا، روش کیسه‌گذاری شکمبه‌ای Mehrez و Orskov (۱۹۷۷) با استفاده از دو رأس تیلیسه هلشتاین دارای فیستولای شکمبه‌ای به کار برده شد و با استفاده از داده‌های حاصل، الگوی تجزیه‌پذیری و میزان پروتئین قابل تجزیه و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه برای کنجاله فرآوری شده محاسبه شد (McDonald و Ørskov, ۱۹۷۹).

تولید شیر و ترکیبات آن: طی هفته پایانی هر دوره آزمایشی، میزان شیر دوشیده شده از هر بزرگ در روز توزین و ثبت شد. روزانه پس از توزین شیر تولیدی هر بزرگ، یک نمونه از شیر در ظرف نمونه‌برداری (حاوی ماده دی‌کرومات‌پتاسیم به عنوان نگهدارنده) جمع‌آوری و به منظور تعیین ترکیبات شیر بزرگها به آزمایشگاه منتقل شد. درصد چربی، پروتئین، لاکتوز، کل مواد جامد و مواد جامد بدون چربی شیر با استفاده از دستگاه Foss MilkoScanTM (Foss, 78110- دانمارک) Minor اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری مصرف ماده خشک و قابلیت هضم ظاهری: در طول هفته نمونه‌برداری میزان ماده خشک مصرفی روزانه از اختلاف میزان خوراک داده شده و باقیمانده‌های خوراک هر دام در همان روز اندازه‌گیری و ثبت شد و به منظور تعیین ماده خشک تا زمان تجزیه شیمیایی در فریزر (۲۰- درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. در طول هفته نمونه‌برداری (هفت روز) از خوراک داده شده به بزرگها در تیمارهای مختلف نمونه برداشته شد، هم‌چنین نمونه مدفعه هر بزرگ-

نژاد رایینی (میانگین چهار سال سن، سه شکم زایش به بالا) با میانگین وزن $22/5 \pm 2$ کیلوگرم و میانگین تولید شیر اولیه $650 - 700$ گرم در روز استفاده شد. مدت زمان اجرای این پژوهش ۸۴ روز شامل چهار دوره ۲۱ روزه بود که در هر دوره ۱۴ روز اول به منظور عادت‌پذیری حیوان به جیره آزمایشی و هفت روز آخر به نمونه‌گیری اختصاص داشت. حیوانات در جایگاه‌های انفرادی (۲×۳ متر) نگهداری شدند و دو بار در روز در ساعات ۰۸:۰۰ و ۱۹:۰۰ دوشیده می‌شدند. جیره‌های آزمایشی (جدول ۱) بر اساس National Research Council, ۲۰۰۷ با نسبت ۴۰ به ۶۰ درصد علوفه به کنسانتره تنظیم شدند و عبارت از: ۱- جیره شاهد، دارای کنجاله فرآوری شده و $14/5$ درصد پروتئین خام، ۲- جیره دارای کنجاله فرآوری شده با $0/8$ درصد فرمالدهید و $14/5$ درصد پروتئین خام، ۳- جیره دارای کنجاله فرآوری شده با $1/2$ درصد فرمالدهید و دارای کنجاله فرآوری شده با $1/2$ درصد فرمالدهید و $12/5$ درصد پروتئین خام بودند. جیره‌ها به صورت کاملاً مخلوط و دو وعده در روز در ساعات ۰۷:۰۰ و ۱۶:۰۰ در حد اشتها به بزرگها تغذیه شد. آب به صورت تازه و آزاد در اختیار حیوانات قرار داشت. پس از خشک شدن در آون، ترکیب شیمیایی نمونه‌ها شامل ماده خشک، ماده آلی، خاکستر، چربی خام، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خشی بر اساس روش استاندارد AOAC, ۱۹۹۰ تعیین شد.

تهیه کنجاله کانولا و فرآوری با فرمالدهید: پس از تهیه کنجاله کانولا، کنجاله آسیاب (توری ۲ میلی‌متر) و درصد پروتئین خام آن تعیین شد. سپس کنجاله کانولا با دو سطح $0/8$ و $1/2$ درصد فرمالدهید (به ازای مقدار پروتئین خام کنجاله) فرآوری شد. به منظور فرآوری، فرمالدهید با آب (به مقدار هشت

تأثیر تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید در دو... / محمدامین تاج‌الدینی و همکاران

هضم ظاهری در کل دستگاه گوارش، خاکستر نامحلول در اسید (AIA) به عنوان نشانگر داخلی به کاربرده شد (Van Keulen, ۱۹۷۷).

صورت مستقیم از داخل رکتوم حدود یک ساعت پس از هر وعده غذایی گرفته شد. نمونه‌های خوراک و مدفوع تا زمان انجام آزمایشات در فریزر با دمای -۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. برای تعیین قابلیت

جدول ۱- اجزای خوراکی و ترکیب شیمیابی جیره‌های آزمایشی (بر اساس ماده خشک).

Table 1. The ingredient components of experimental diets (% of DM).

نوع کنجاله کانولا و سطح پروتئین خام (%) Canola meal type and CP level (%)					اجزای مواد خوراکی (درصد) Ingredients (%)
فرآوری شده (1.2)	فرآوری شده (0.8)	فرآوری شده +	فرآوری شده (1.2)	فرآوری شده (0.8)	علوفه خشک یونجه
Treated (1.2) +12.5	Treated (1.2) +14.5	Treated (0.8) +14.5		Untreated + 14.5	کاه گندم
35.0	35.0	35.0	35.0	Alfalfa hay	دانه چو
5.0	5.0	5.0	5.0	Wheat straw	دانه گندم
21.0	21.0	21.0	21.0	Barley grain	
12.0	12.0	12.0	12.0	Wheat grain	
13.0	4.0	4.0	4.0	Corn grain	دانه ذرت
9.0	18.0	18.0	18.0	Canola meal	کنجاله کانولا
3.0	3.0	3.0	3.0	Wheat bran	سبوس گندم
1.2	1.2	1.2	1.2	Vitamin/Minera Premix ^۱	مکمل معدنی و ویتامینی ^۱
0.3	0.3	0.3	0.3	Calcium carbonate	کربنات کلسیم
0.5	0.5	0.5	0.5	Salt	نمک
ترکیب شیمیابی (درصد ماده خشک) Chemical composition (%DM)					
انرژی قابل منابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم) Metabolizable energy (Mcal/Kg)					
2.48	2.42	2.41	2.42	CP (%DM)	پروتئین خام (درصد ماده خشک)
12.42	14.31	14.32	14.39	DM (%)	ماده خشک (درصد)
88.9	89.1	89.1	89.52	OM (%DM)	ماده آلی (درصد ماده خشک)
85.7	86.8	86.5	88	RUP (%CP)	پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه ^۲ (درصد پروتئین خام)
36.9	39.54	33.15	29.95	RDP (%CP)	پروتئین قابل تجزیه در شکمبه ^۳ (درصد پروتئین خام)
63.10	60.46	66.85	70.05	EE (%DM)	چربی خام (درصد ماده خشک)
2.38	2.33	2.30	2.32	NDF (DM)	الیاف نامحلول در شوینده خشکی (درصد ماده خشک)
34.60	36.77	36.85	36.89	ADF (%DM)	الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد ماده خشک)
22.10	23.45	23.45	23.45	NFC (%DM)	کربوهیدرات‌های غیرالیافی ^۴ (درصد ماده خشک)
36.3	33.2	33	34.3		

^۱ دارای ۵۰۰/۰۰۰ واحد ویتامین A, ۱۲۰/۰۰۰ واحد ویتامین D, ۲۰۰۰ واحد ویتامین E در هر کیلوگرم و عناصر معدنی بر اساس میلی‌گرم شامل Ca, P, Se, I, Co, Cu, Mn, Zn, Mg, Na, P, I, Fe, Mn, Zn, Mg, Na, P.

^۲ Contains 500,000 IU of Vitamin A; 120,000 IU of Vitamin D₃ and 2000 IU of Vitamin E and 190000 mg Ca, 25000 mg P, 40000 mg Na, 30000 mg Mg, 5000 mg Zn, 3500 mg Mn, 2500 mg Fe, 400 mg Cu, 35 mg Co, 90 mg I, and 40 mg Se to Kg.

^۳ RUP = Rumen Undegradable Protein

^۴ RDP = Rumen Degradable Protein

^۴ Non-fiber carbohydrates, NFC = (حاکستر+چربی خام+پروتئین خام+الیاف نامحلول در شوینده خشکی) × ۱۰۰

قیمت هر کیلوگرم جیره آزمایشی × ضریب تبدیل غذایی=هزینه تمام شده خوراک جهت تولید شیر هزینه خوراک مصرفی روزانه - (قیمت شیر × تولید شیر خام روزانه) = سود ناخالص روزانه

تجزیه و تحلیل آماری

این آزمایش با استفاده از ۴ جیره آزمایشی در قالب طرح چرخشی مریع لاتین 4×4 تکرار شده در چهار دوره ۲۱ روزه اجرا شد. پس از انجام طرح آزمایشی، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده ازتابع lmer و نرمافزار lme4 تحت برنامه آماری R (نسخه 3.6.1) (<https://www.r-project.org/>) استفاده شد. میانگین متغیرها در تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون توکی در سطح معنی‌داری ۵ درصد مقایسه شدند. هم‌چنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مدل آماری زیر مورد استفاده قرار گرفت:

$$Y_{ijk} = \mu + T_i + P_j + C_k + e_{ijk}$$

در این رابطه: Y_{ijk} =متغیر وابسته (صفت اندازه‌گیری شده)، μ =میانگین جامعه برای صفت مورد مطالعه، T_i =اثر تیمار، P_j =اثر دوره، C_k =اثر تصادفی هر حیوان و e_{ijk} =اثر خطای آزمایشی بود.

نتایج و بحث

تجزیه‌پذیری شکمبهای پروتئین خام کنجاله کانولا: نتایج مربوط به میزان تجزیه‌پذیری شکمبهای پروتئین خام کنجاله کانولا با یا بدون فرآوری تأثیری بر درصد (جدول ۲) نشان داد این فرآوری تأثیری بر درصد پروتئین خام کنجاله نداشت. هم‌چنین در تحقیقی دیگر، به دنبال فرآوری کنجاله کانولا با حرارت و یا لیگنوسولفونات، تفاوتی در درصد پروتئین خام کنجاله مشاهده نشد (Wright و همکاران، ۲۰۰۵). در تحقیق حاضر، فرآوری با فرمالدهید میزان تجزیه‌پذیری شکمبهای پروتئین خام کنجاله کانولا را کاهش داد

نمونه‌گیری از مایع شکمبه: در روز آخر هر دوره آزمایشی، نمونه‌گیری از مایع شکمبه در ساعت صفر (پیش از مصرف خوراک) و سه ساعت پس از مصرف خوراک با استفاده لوله معدی متصل به دستگاه ساکشن انجام شد. بلافضله پس از نمونه‌گیری، pH مایع شکمبه با استفاده از دستگاه pH متر قلمی (مدل AZ 8686) اندازه‌گیری شد. سپس مایع شکمبه توسط پارچه کرباس چهار لایه صاف شد. مقدار ده میلی‌لیتر از مایع صاف شده برداشته شد و با افزودن ۰/۲ میلی‌لیتر اسیدسولفوریک ۵۰ درصد (شرکت Merck) به منظور تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی در فریزر با دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (Reynal، ۲۰۰۷). تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه بر طبق روش Broderick و Kang (۱۹۸۰) با استفاده از محلول‌های فنول، هیپوکلریت و محلول استوک ۱۰۰ میلی‌مولاری آمونیاک انجام شد (۵).

به منظور شمارش پروتزوآ، میزان ده میلی‌لیتر از مایع صاف شده نیز با همین مقدار محلول نگهدارنده MFS (Methylgreen-formalin-salin) مخلوط شده و برای شمارش پروتزوآ در فضایی تاریک نگهداری شد (Ogimoto و Imai، ۱۹۸۱). گونه‌های متفاوت پروتزوآی مژکدار در قالب گونه‌های انتوپینیومورف (*Holotrich* sp.)، هلوتریش (*Entodinium* sp.) و سلولولیتیک (*Cellulolytic* sp.) گروه‌بندی شدند و جمعیت کل پروتزوآ و گونه‌های مختلف پس از شمارش برآورد شد.

برآورد اقتصادی جیره‌های آزمایشی: برآورد اقتصادی جیره‌های آزمایشی و تعیین هزینه تمام شده خوراک به‌ازای تولید شیر و هم‌چنین برآورد سود ناخالص روزانه در هر گروه، بر اساس قیمت هر کیلوگرم از جیره‌های آزمایشی مختلف تعیین و با استفاده از روابط زیر انجام شد:

تأثیر تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید در دو... / محمدامین تاجالدینی و همکاران

پروتئین خام کنجاله کانولا در نتیجه فرآوری با فرمالدھید در سطوح $0/8$ و $1/2$ درصد و همچنین لیگنوسولفونات مشاهده گردید (Beauchemin و همکاران، ۱۹۹۵؛ Eghbali و همکاران، ۲۰۱۱؛ Mir و همکاران، ۱۹۸۴).

(P<0.05)؛ به طوری که در فرآوری کنجاله با $0/8$ درصد فرمالدھید حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و در فرآوری با $1/2$ درصد فرمالدھید به حدود ۳۰ درصد این میزان در کنجاله فرآوری نشده رسید. در نتایجی مشابه با این پژوهش کاهش تجزیه‌پذیری شکمبهای

جدول ۲- تجزیه‌پذیری پروتئین خام کنجاله کانولای فرآوری نشده و فرآوری شده با فرمالدھید (\pm خطای معیار).

Table 2- Crude protein degradability of untreated and formaldehyde treated canola meal (\pm SE).

P- value	فرآوری شده با $0/8$ درصد		فرآوری نشده Untreated	نوع کنجاله کانولا Type of canola meal
	Treated (1.2%)	Treated (0.8%)		
0.38	29.5 ± 0.34	29.7 ± 0.34	30.2 ± 0.34	پروتئین خام (درصد ماده خشک)
<0.01	$27.6^c \pm 0.63$	$63.1^b \pm 0.63$	$80.7^a \pm 0.63$	Crude protein (%DM) پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (درصد پروتئین خام)
<0.01	$72.4^a \pm 0.63$	$36.9^b \pm 0.63$	$19.3^c \pm 0.63$	RDP (%CP) پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (درصد پروتئین خام)
				RUP (%CP)

^{a,b} حروف متفاوت در هر سطر نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار می‌باشد (P<0.05).

^{a,b} Means within row with different superscripts a,b differ (P<0.05).

کنجاله کانولای بدون فرآوری با کنجاله فرآوری شده با لیگنوسولفونات، افزایش مصرف ماده خشک گاوهاشای شیری را نسبت به گروه شاهد گزارش کردند (۳۸). علاوه بر این، در مطالعاتی دیگر افزایش سطح ماده خشک مصرفی گروههای آزمایشی در نتیجه افزایش سطح پروتئین عبوری جیره و همچنین فرآوری کنجاله‌ها با فرمالدھید مشاهده شده است (Bhatt و Khampa، ۲۰۱۹؛ Sahoo و Bunnakit، ۲۰۱۱).

در این مطالعه، ضریب تبدیل خوراک بزهای تغذیه شده با جیره دارای کنجاله فرآوری شده با $1/2$ درصد فرمالدھید و $12/5$ درصد پروتئین خام در مقایسه با جیره دارای کنجاله فرآوری شده با $0/8$ درصد فرمالدھید پایین‌تر بود (P<0.05)، زیرا در کنار افزایش یکنواخت مصرف ماده خشک و تولید شیر، گروه تغذیه شده با جیره دارای پروتئین خام کمتر، به طور نسبی با مصرف ماده خشک کمتر تولید بیشتری داشتند. در نتایجی همسو با پژوهش حاضر، بهبود

عملکرد رشد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی: مصرف ماده خشک بزها در تغذیه با کنجاله کانولا فرآوری شده با فرمالدھید نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (P<0.05)، در حالی که با کاهش سطح پروتئین خام جیره تغییری نکرد (جدول ۳). افزایش سطح پروتئین عبوری جیره با افزایش جریان پروتئین و اسیدهای آمینه به روده باریک به تعادل اسیدهای آمینه قابل جذب از روده کمک کرده و این امر می‌تواند سبب بهبود مصرف خوراک گردد (Baker و همکاران، ۱۹۹۶؛ Forbes، ۱۹۹۵). در تحقیق حاضر، فرآوری کنجاله کانولا با فرمالدھید سطح پروتئین عبوری جیره‌های آزمایشی را نسبت به جیره شاهد افزایش داد که احتمالاً همین عامل سبب تحریک مصرف خوراک بزها شده است. همچنین، به دنبال افزایش تولید شیر بزها، به دلیل افزایش احتیاجات مواد مغذی، افزایش مصرف خوراک منطقی به نظر می‌رسد (Baker و همکاران، ۱۹۹۶). همسو با نتایج حاضر، Wright و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه خود در نتیجه جایگزینی

با فرمالدهید و همچنین کاهش سطح پروتئین خام جیره مانع هضم پذیری و جذب مواد مغذی به ویژه پروتئین خام خوراک نشده و اثر منفی بر آن نداشت. همسو با نتایج این مطالعه، جایگزینی کنجاله خردل فرآوری شده با فرمالدهید در جیره گاوهاش شیرده اثری بر قابلیت هضم مواد مغذی نداشت، در حالی که سبب بهبود تولید شیر شد (Sirohi و همکاران، ۲۰۱۳). در مطالعات دیگری همچنین تفاوتی در قابلیت هضم مواد مغذی جیره‌های غذایی در نتیجه تغذیه با کنجاله‌های خردل و کلزای فرآوری شده با Throat فرمالدهید گزارش نشد (Chatterjee، ۱۹۹۸؛ Tahmasbi و همکاران، ۲۰۱۶).

ضریب تبدیل خوراک در گروه‌های آزمایشی تغذیه شده با کنجاله سویا و کلزای فرآوری شده با فرمالدهید مشاهده شد (Bhatt و Sahoo، ۲۰۱۹؛ Throat و همکاران، ۲۰۱۶). در حالی که در مطالعه دیگری با جایگزینی دانه سویا بر شرط شده و اکسترود شده با کنجاله سویا در جیره گاوهاش شیری تفاوتی در ضریب تبدیل خوراک گاوها مشاهده نشد (Tahmasbi و همکاران، ۲۰۱۸).

در این پژوهش، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین خام و چربی خام جیره‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری نبود که نشان می‌دهد فرآوری کنجاله کانولا

جدول ۳- مصرف ماده خشک، ضریب تبدیل غذایی، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در بزهای تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی (\pm SE) معیار).

Table 3- Dry matter intake, feed conversion ratio and nutrients apparent digestibility of goats fed experimental diets (\pm SE).

P-value	نوع کنجاله کانولا و سطح پروتئین خام (درصد)					آیتم Item	
	Canola meal type and CP level (%)						
	+ فرآوری شده (1.2)	(1.2) فرآوری شده	فرآوری شده	فرآوری شده +			
	12.5 Treated (1.2) +12.5	14.5 + Treated (1.2) +14.5	14.5 + (0.8) Treated (0.8) +14.5	14.5 Untreated + 14.5			
<0.01	851 ^a ±47.1	887 ^a ±48.0	865 ^a ±47.1	764 ^b ±48.0	صرف ماده خشک (گرم/روز) DMI (g/d)		
<0.01	1.07 ^b ±0.04	1.13 ^{ab} ±0.05	1.21 ^a ±0.04	1.17 ^{ab} ±0.05	FCR ¹ قابلیت هضم (درصد) Digestibility (%)	ضریب تبدیل غذایی	
0.23	78.8 ±1.28	80.3 ±1.14	77.6 ±1.28	80.5 ±0.92	Dry matter	ماده خشک	
0.30	79.2 ±1.98	79.9 ±1.49	78.7 ±1.98	82.6 ±1.49	Organic matter	ماده آلی	
0.17	69.6 ±2.88	76.4 ±3.03	68.4 ±2.95	73.7 ±2.25	Crude protein	پروتئین خام	
0.92	77.8 ±4.68	79.2 ±4.63	80.4 ±4.68	82.9 ±4.63	Ether extract	چربی خام	
0.21	75.7 ±1.98	77.9 ±1.95	73.4 ±1.63	78.1 ±1.52	NDF	الیاف نامحلول در شوینده خنثی	

^{a,b} حروف متفاوت در هر سطر نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار می‌باشد ($P<0.05$).

¹ Feed Conversion Ratio (FCR)= (گرم)/خوراک مصرفی (گرم) شیر تولیدی.

a,b Means within row with different superscripts a,b differ ($P<0.05$).

۱۴ درصد افزایش یافت ($P<0.05$) و کاهش سطح پروتئین خام جیره سبب افت تولید شیر بزها نشد (جدول ۴). تفاوت نداشتن تولید شیر بزها در تغذیه با جیره‌های دارای ۱۴/۵ و ۱۲/۵ درصد پروتئین خام

تولید و ترکیب شیر: با تغذیه کنجاله کانولا فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدهید، تولید روزانه شیر خام بزها به طور میانگین بیش از ۱۶ درصد و تولید روزانه شیر تصحیح شده بر اساس چربی حدود

و کنجاله سویا فرآوری شده با حرارت و یا لیگنوسولفونات در جیره گاوهاش شیری تفاوتی در ترکیب شیر گزارش نشد (Mishra و همکاران، ۲۰۱۸؛ Wright و همکاران، ۲۰۰۵). درحالی‌که در نتیجه جایگزینی بخشی از لوپیای خردشده (تیمار شاهد) با کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید در جیره گاوهاش شیری درصد پروتئین شیر و تولید روزانه آن افزایش و درصد چربی و لاکتوز شیر کاهش یافت (White و همکاران، ۲۰۰۴). در آزمایشی دیگر روی گاومیش‌های شیرده در اوایل دوره شیردهی، Shelke و همکاران (۲۰۱۲) گزارش کردند تغذیه با محلول کنجاله خردل و بادام زمینی فرآوری شده با فرمالدھید و چربی محافظت شده تأثیری بر درصد کل مواد جامد، مواد جامد بدون چربی، پروتئین و لاکتوز نداشت اما چربی شیر بالاتر بود (Shelke و همکاران، ۲۰۱۲).

pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتزووای شکمبه: در نتیجه تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید و همچنین کاهش سطح پروتئین خام جیره تفاوتی در pH مایع شکمبه بزها مشاهده نشد (شکل ۱). ولی پس از مصرف خوراک، غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بزها با تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید در مقایسه با کنجاله فرآوری نشده کاهش یافت ($P < 0.05$) که احتمالاً در اثر کاهش نرخ تجزیه پروتئین در شکمبه و افزایش عبور از شکمبه می‌باشد. همچنین با کاهش سطح پروتئین خام جیره در کنار استفاده از کنجاله فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید، میزان پروتئین ورودی و قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم‌های شکمبه کاهش یافته و در نتیجه پایین‌ترین غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در این گروه مشاهده شد (شکل ۲).

نشان می‌دهد پروتئین عبوری تأمین شده با استفاده از کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید، احتمالاً اسیدهای آمینه محدود‌کننده تولید شیر را به مقدار کافی جهت رفع احتیاجات بافت پستان در سطح ۱۲/۵ درصد پروتئین خام فراهم کرده و تأمین مقدار بیشتر آن در جیره اثری بر تولید ندارد. همچنین افزایش تولید شیر تصحیح شده بر اساس چهار درصد چربی با تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید با توجه به عدم کاهش درصد چربی، پروتئین و لاکتوز شیر بزها منطقی به نظر می‌رسد. در پژوهشی Lundquist و همکاران (۱۹۸۶) گزارش کردند تغذیه گاوهاش شیری با کنجاله فرآوری شده با فرمالدھید (جیره دارای ۱۵/۵ درصد پروتئین خام) به طور معنی‌داری سبب افزایش تولید شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس چربی نسبت به گروه شاهد Lundquist منفی (۱۲ درصد پروتئین خام) شد (Lundquist و همکاران، ۱۹۸۶). اگرچه در مطالعاتی دیگر با اینکه افزایش میزان جذب اسیدهای آمینه ضروری از روده در نتیجه فرآوری گزارش شد، تفاوتی در عملکرد گاوهاش شیری در نتیجه تغذیه با کنجاله‌های سویا و کانولای فرآوری شده با فرمالدھید مشاهده نشد (Crooker و همکاران، ۱۹۸۳؛ Rae و همکاران، ۱۹۸۳).

لغزه جیره‌های آزمایشی، در این مطالعه، بر درصد ترکیب شیر بزها تأثیری نداشت، با این حال تولید روزانه چربی، پروتئین و لاکتوز به‌طور معنی‌داری در تغذیه با کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید در سطوح ۱۴/۵ و ۱۲/۵ درصد پروتئین خام جیره افزایش یافت که این امر به‌دلیل افزایش تولید روزانه شیر می‌باشد ($P < 0.05$). مطابق با نتایج این تحقیق، با جایگزینی کنجاله خردل فرآوری شده با فرمالدھید در جیره گاومیش‌های شیرده

جدول ۴- تولید و ترکیبات شیر بزهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی (خطای معیار).


Table 4- Milk yield and compositions of goats fed experimental diets.

P-value	نوع کنجاله کانولا و سطح پروتئین خام (درصد)				تولید و ترکیب شیر Milk yield and composition	
	Canola meal type and CP level (%)					
	فرآوری شده 12.5 + (1.2) Treated (1.2) +12.5	فرآوری شده 14.5 + (1.2) Treated (1.2) +14.5	فرآوری شده 14.5 + (0.8) Treated (0.8) +14.5	فرآوری نشده + 14.5 Untreated + 14.5		
<0.01	793 ^a ±46.3	799 ^a ±47.3	747 ^{ab} ±46.3	682 ^b ±47.3	تولید شیر (گرم/روز) Milk yield (g/d)	
<0.01	955 ^a ±47.5	950 ^a ±49.4	874 ^{ab} ±47.3	838 ^b ±49.0	شیر تصحیح شده براساس ۴ درصد چربی FCM (g/d) ^۱	
0.30	5.35 ±0.19	5.27 ±0.20	5.18 ±0.19	5.44 ±0.20	ترکیبات شیر (درصد) (%)	
0.56	3.88 ±0.06	3.77 ±0.07	3.85 ±0.06	3.76 ±0.07	چربی Protein	
0.59	4.11 ±0.07	4.12 ±0.07	4.13 ±0.07	4.15 ±0.07	پروتئین Lactose	
0.29	14.2 ±0.21	13.9 ±0.22	14.0 ±0.21	14.2 ±0.22	لакتوز Total solids	
0.92	8.92 ±0.06	8.86 ±0.07	8.87 ±0.06	8.88 ±0.07	کل مواد جامد Non-fat solids	
					مواد جامد بدون چربی	
					تولید ترکیبات شیر (گرم/روز) Milk composition yield (g/d)	
<0.01	42.5 ^a ±2.08	42.0 ^a ±2.19	38.3 ^{ab} ±2.07	37.7 ^b ±2.17	چربی Fat	
<0.01	31.1 ^a ±1.87	30.7 ^a ±1.93	28.9 ^{ab} ±1.86	26.0 ^b ±1.92	پروتئین Protein	
<0.01	32.8 ^a ±2.07	33.0 ^a ±2.12	30.7 ^{ab} ±2.06	28.5 ^b ±2.11	لакتوز Lactose	

^{a,b} حروف متفاوت در هر سطر نشان دهنده تفاوت معنی دار می باشد ($P < 0.05$).

¹Fat corrected milk (FCM) = [۱۵ × گرم چربی تولید شده) + (۰/۴ × گرم شیر تولیدی)] (NRC, 2001).

^{a,b}Means within row with different superscripts a,b differ ($P < 0.05$).



شکل ۱- pH مایع شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی در ساعت ۰ و ۳ ساعت پس از مصرف خوراک

Figure 1- Ruminal pH of goats fed experimental diets at 0 and 3 hours after feeding.


میزان تجزیه پذیری پروتئین در شکمبه گاوها کاهش یافت (Mahadevan و همکاران، ۱۹۸۳). همچنین در تحقیق دیگری، Crooker و همکاران (۱۹۸۳) با

همسو با نتایج این تحقیق، در مطالعه دیگری گزارش شد با افزایش سطح فرمالدهید مورد انتقاده برای فرآوری کنجاله سویا، غلظت نیتروژن آمونیاکی و

تأثیر تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید در دو... / محمدامین تاج‌الدینی و همکاران

و همکاران، ۱۹۸۳). با این حال در مطالعاتی دیگر، در نتیجه استفاده از کنجاله و یا دانه سویای حرارت داده شده در جیره گاوهاش شیری تفاوتی در pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه مشاهده نشد Tahmasbi و همکاران، Noerooz Deyarjan، ۲۰۱۷؛ و همکاران، ۲۰۱۸).

بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویای فرآوری شده با فرمالدھید در دو سطح پروتئین خام جیره بر فراسنجه‌های شکمبه گاوهاش شیری تازه‌زا، گزارش کردند سطح پروتئین خام و فرآوری با فرمالدھید هر دو بر غلظت نیتروژن آمونیاکی مؤثر بود و تغذیه با کنجاله فرآوری شده اثر مهمی در کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه داشت Crooker ().



شکل ۲- غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی در ساعت ۰ و ۳ ساعت پس از مصرف خوراک

Figure 2- Ruminal NH₃-N of goats fed experimental diets at 0 and 3 hours after feeding.

فرمالدھید در جیره بردهای پرواری تغییری در جمعیت هلوتریش‌ها و همچنین کل پروتوزوآی شکمبه ایجاد نشد (Bhatt و Sahoo، ۲۰۱۹). همچنین در پژوهشی، محققین تغییرات جمعیت پروتوزوآی شکمبه را در نتیجه جایگزینی کنجاله سویای حرارت داده شده با کنجاله بدون فرآوری در جیره گاوهاش هلشتاین دارای فیستولای شکمبه‌ای بررسی و گزارش کردند جمعیت هلوتریش‌ها، انتوپنیومورف‌ها و کل پروتوزوآی شکمبه در ساعت مختلف پس از مصرف خوراک تفاوتی در بین جیره‌های آزمایشی نداشت درحالی که به طور میانگین جمعیت آن‌ها در تغذیه با کنجاله حرارت دیده نسبت به کنجاله بدون فرآوری پایین‌تر بود (Dennis و همکاران، ۱۹۸۲).

تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید و همچنین تفاوت در سطح پروتئین خام جیره بزها بر جمعیت گونه‌های هلوتریش، سلولولیتیک و انتوپنیومورف‌ها و جمعیت کل پروتوزوآی مایع شکمبه اثری نداشت (جدول ۵). در تحقیقی اثر افزایش سطح پروتئین عبوری جیره در گاوهاش خشک دارای فیستولای شکمبه‌ای بررسی و نتایج نشان داد، با افزایش سطح پروتئین عبوری در جیره، جمعیت گونه‌های هلوتریش تغییری نکرد در حالی که جمعیت انتوپنیوم‌های کوچک و همچنین جمعیت کل پروتوزوآی شکمبه افزایش یافت (Kanjanapruthipong و همکاران، ۲۰۰۲). مطابق با نتایج تحقیق حاضر، در مطالعه‌ای با جایگزینی مخلوط کنجاله‌های سویا و بادام زمینی فرآوری شده با

جدول ۵- جمعیت گونه‌های مختلف و کل پروتوزوآی شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی (\pm خطای معیار)Table 5. Different species and total ruminal protozoa count of goats fed experimental diets (\pm SE)

P- value	نوع کنجاله کانولا و سطح پروتئین خام (درصد)					جمعیت پروتوزوآی شکمبه ($\times 10^5$) Protozoal count ($\times 10^5$)	
	Canola meal type and CP level (%)						
	فرآوری شده 12.5 + (1.2) Treated (1.2) +12.5	فرآوری شده (0.8) 14.5 + Treated (1.2) +14.5	فرآوری شده (0.8) 14.5 + Treated (0.8) +14.5	فرآوری نشده + 14.5 Untreated + 14.5			
0.33	19.1 ± 1.31	19.1 ± 1.31	20.2 ± 1.31	22.2 ± 1.31	0h	انتودینیومورف ساعت صفر	
0.22	18.3 ± 1.30	18.6 ± 1.80	17.7 ± 1.09	20.7 ± 1.88	3h	ساعت ۳ هلوتریش	
0.31	0.32 ± 0.19	0.60 ± 0.15	0.71 ± 0.15	0.60 ± 0.16	0h	ساعت صفر	
0.58	0.63 ± 0.11	0.49 ± 0.09	0.47 ± 0.07	0.61 ± 0.17	3h	ساعت ۳ سلولولیتیک	
0.27	0.21 ± 0.13	0.29 ± 0.12	0.38 ± 0.12	0.33 ± 0.12	0h	ساعت صفر	
0.22	0.15 ± 0.08	0.21 ± 0.07	0.39 ± 0.09	0.43 ± 0.13	3h	ساعت ۳ کل	
0.41	20.4 ± 2.31	20.1 ± 1.67	21.4 ± 1.56	23.6 ± 1.67	0h	ساعت صفر	
0.39	20.6 ± 2.23	19.4 ± 2.01	18.4 ± 1.21	23.7 ± 2.89	3h	ساعت ۳	

^{a,b} حروف متفاوت در هر سطر نشان‌دهنده تفاوت معنی دار می‌باشد ($P < 0.05$).^{a,b} Means within row with different superscripts a,b differ ($P < 0.05$).

گروه در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی بالاتر بوده است. سود ناخالص حاصل از تولید شیر روزانه در گروه‌های تغذیه شده با جیره‌های دارای کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدهید به طور قابل توجهی نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (P<0.05). به علاوه، به واسطه افزایش قابل توجه تولید شیر روزانه و همچنین افزایش اندازه هزینه خوراک مصرفی روزانه در گروه‌های آزمایشی تغذیه شده با کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدهید در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (P<0.05) که به دلیل بالاتر بودن مصرف خوراک روزانه بزهای می‌باشد. از طرفی در مقایسه با گروه شاهد، سود ناخالص روزانه از تولید شیر افزایش یافت و از این نظر گروه تغذیه شده با جیره دارای کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدهید و ۱۲/۵ درصد پروتئین خام با توجه به این که قیمت جیره در این گروه نسبت به سایر گروه‌ها پایین‌تر بود، بالاترین سود ناخالص روزانه را در بین گروه‌های آزمایشی داشت.

برآورد بازده اقتصادی: با جایگزینی کنجاله کانولا با دانه ذرت در جیره دارای ۱۲/۵ درصد پروتئین خام (به دلیل پایین‌تر بودن قیمت دانه ذرت نسبت به کنجاله کانولا)، قیمت هر کیلوگرم جیره نسبت به سایر جیره‌ها پایین‌تر بود. میانگین هزینه روزانه خوراک مصرفی بزهای تغذیه شده با جیره‌های دارای کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدهید در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (P<0.05) که به دلیل بالاتر بودن مصرف خوراک روزانه بزهای می‌باشد. از طرفی بالاترین هزینه تمام‌شده خوراک برای تولید هر کیلوگرم شیر مربوط به بزهای تغذیه شده با جیره دارای کنجاله کانولای فرآوری شده با ۰/۸ درصد فرمالدهید و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام بود (P<0.05). با توجه به این که ضریب تبدیل خوراک (میزان خوراک مصرفی به ازای تولید هر کیلوگرم شیر) در این گروه نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر بود، بنابراین منطقی است که هزینه تمام‌شده برای تولید شیر در این

تأثیر تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدھید در دو... / محمدامین تاج‌الدینی و همکاران

جدول ۶- برآورد اقتصادی هزینه خوراک مصرفی و تولید شیر در برهای تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی (\pm خطای معیار)

Table 6- Economic estimation of feed and milk cost and profit of goats fed experimental diets (\pm SE)

P-value	نوع کنجاله کانولا و سطح پروتئین خام (درصد)					آماره‌های اقتصادی Economic statistics	
	Canola meal type and CP level (%)						
	فرآوری شده (1.2) 12.5 +	فرآوری شده (1.2) 14.5 +	فرآوری شده (1.2) 14.5 + (0.8)	فرآوری نشده + 14.5	فرآوری نشده + Untreated+ 14.5		
-	30320	31720	31570	31260		قیمت جیره آزمایشی (ریال/ کیلوگرم)	
<0.01	851 ^a ±47.1	887 ^a ±48.0	865 ^a ±47.1	764 ^b ±48.0		Experimental diet price (Rial/ Kg)	
<0.01	25562 ^a ±1520	27141 ^a ±1560	26762 ^a ±1520	23298 ^b ±1560		مصرف خوراک (گرم)	
<0.01	27434 ^{bc} ±1960	31159 ^{ab} ±2060	32478 ^a ±1960	27878 ^b ±2060		Feed intake (g)	
<0.01	53260 ^{ab} ±3460	53100 ^b ±3680	47840 ^{bc} ±3520	43880 ^c ±3680		هزینه خوراک مصرفی روزانه (ریال)	
						Daily feed cost (Rial)	
						هزینه تمام‌شده خوراک (ریال/ کیلوگرم شیر)	
						Cost of feed (Rial/ Kg of milk)	
						سود ناخالص روزانه (ریال)	
						Daily gross profit (Rial)	

^{a,b} حروف متفاوت در هر سطر نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار می‌باشد ($P<0.05$).

در برآورد سود ناخالص روزانه هزینه‌های جانبی تولید از قبیل هزینه کارگری، تجهیزات مورد استفاده، حمل و نقل شیر و غیره منظور نشده است.

¹The estimated gross daily income does not include production side costs like labor costs, equipment used, milk transport, etc.

^{a,b}Means within row with different superscripts a,b differ ($P<0.05$).

نشد؛ بنابراین، فرآوری کنجاله کانولا با فرمالدھید را می‌توان راهبرد مناسبی برای افزایش سطح پروتئین عبوری جیره دانست که با به کار بردن آن می‌توان سطح پروتئین خام جیره را بهینه کرده و استفاده از منابع پروتئینی را در جیره کاهش داد که این امر به علاوه سهم چشم‌گیری در کاهش هزینه‌های خوراک مصرفی داشته و هم‌چنین در کاهش آلودگی محیطی ناشی از نیتروژن بسیار مؤثر خواهد بود.

نتیجه‌گیری کلی

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که فرآوری کنجاله کانولا با ۱/۲ درصد فرمالدھید به طور مطلوبی سبب بهبود مصرف خوراک و عملکرد تولیدی برهای شیرده شد. به علاوه، تغذیه با کنجاله کانولای فرآوری شده با ۱/۲ درصد فرمالدھید به خوبی اثرات احتمالی کمبود پروتئین خام جیره را جبران کرده و با کاهش سطح پروتئین خام جیره عملکرد کلی برهای دچار تغییر

منابع

- Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 1990. Official Methods of Analysis, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
- Baker, M.J., Amos, H.E., Nelson, A., Williams, C.C. and Froetschel, M.A. 1996.Undegraded intake protein: Effects on milk production and amino acid utilization by cows fed wheat silage. Canadian Journal of Animal Science, 76: 367-376.
- Beauchemin, K.A., Bailey, D.R.C., McAllister, T.A. and Cheng, K.J. 1995. Lignosulfonate-treated canola meal for nursing beef calves. Canadian Journal of Animal Science, 75(4): 559-565.
- Bhatt, R.S. and Sahoo, A. 2019. Effect of adding formaldehyde treated protein alone and with *Saccharomyces cerevisiae* in diet on plane of nutrition, growth performance, rumen fermentation and microbial protein synthesis of finisher lambs. Small Ruminant Research, 171: 42-48.
- Broderick, G.A. and Kang, J.H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and

- total amino acids in ruminal fluid and *in vitro* media. *Journal of Dairy Science*, 63: 64-75.
- Bunnakit, K. and Khampa, S. 2011. Effect of rumen undegradable protein levels on performance of Thai native x Brahman beef cattle. *Pakistan Journal of Nutrition*, 10: 1163-1167.
- Chatterjee, A. 1998. Ruminal and Post-Ruminal Digestibility of Formaldehyde Treated Mustard Cake Protein and Its Effect on Growth and Milk Production in Murrah Buffaloes. Ph.D. Thesis. NDRI, Karnal.
- Chaturvedi, O.H. and Walli, T.K. 2001. Effect of feeding graded levels of undegraded dietary protein on voluntary intake, milk production and economic return in early lactating crossbred cows. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 14: 1118-1124.
- Crooker, B.A., Clark, J.H. and Shanks, R.D. 1983. Effects of formaldehyde treated soybean meal on milk yield, milk composition, and nutrient digestibility in the dairy cow. *Journal of Dairy Science*, 66: 492-504.
- De Campeneere, S., De Boever, J.L., Vanacker, J.M. and De Brabander, D.L. 2010. Reducing nitrogen excretion and soybean meal use by feeding a lower rumen degradable protein balance and protected soybean meal to dairy cattle. *Archives of Animal Nutrition*, 64: 85-97.
- Dennis, S.M., Arambel, M.J., Bartley, E.E., Riddell, D.O. and Dayton, A.D. 1982. Effect of heated or unheated soybean meal with or without Niacin on rumen protozoa. *Journal of Dairy Science*, 65: 1643-1646.
- Eghbali, M., Kafilzadeh, F., Hozhabri, F., Afshar, S. and Kazemi-Bonchenari, M. 2011. Treating canola meal changes *in situ* degradation, nutrient apparent digestibility, and protein fractions in sheep. *Small Ruminant Research*, 96: 136-139.
- FAO. 2020. The Livestock Impact on Global Nitrogen Flows and Emissions.
- Forbes, J.M. 1995. Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals. pp. 226-234. CAB Int. Oxford U.K.
- Gulati, S.K., Garg, M.R. and Scott, T.W. 2005. Rumen protected protein and fat produced from oilseeds and/or meals by formaldehyde treatment; their role in ruminant production and product quality: a review. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 45: 1189-1203.
- Hadjipanayiotou, M. 1992. Effect of protein source and formaldehyde treatment on lactation performance of Chios ewes and Damascus goats. *Small Ruminant Research*, 8: 185-197.
- Kanjanapruthipong, J., Vajrabukka, C. and Sindhuvanich, S. 2002. Effects of formalin treated soy bean as a source of rumen undegradable protein on rumen functions of non-lactating dairy cows on concentrate based-diets. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 15: 1439-1444.
- Lundquist, R.G., Otterby, D.E. and Linn, J.G. 1986. Influence of formaldehyde-treated soybean meal on milk production. *Journal of Dairy Science*, 69: 1337-1345.
- Mahadevan, S., Teather, R.M., Erfle, J.D. and Sauer, F.D. 1983. Effect of formaldehyde treatment of soybean meal on rates of protein degradation and microbial protein concentration in the bovine rumen. *Canadian Journal of Animal Science*, 63: 181-190.
- McKinon, J.J., Olubobokun, J.A., Mustafa, A. and Christensen, R.D.H. 1995. Influence of dry heat treatment of canola meal on site and extent of nutrient disappearance in ruminants. *Journal of Animal Feed Science and Technology*, 56: 243-252.
- Mehrez, A.Z. and Orskov, E.R. 1977. A study on the artificial fibre bag technique for determining the digestibility of feeds in the rumen. *The Journal of Agricultural Science*, 88: 645-650.
- Mir, Z., MacLeod, G.K., Buchanan-Smith, J.G., Grieve, D.G. and Grovum, W.L. 1984. Methods for protecting soybean and canola proteins from degradation in the rumen. *Canadian Journal of Animal Science*, 64(4): 855-865.
- Mishra, R.K., Baghel, R.P.S., Mishra, C., Sharma, R. and Sharma, S. 2018. Effect of balance diet containing formaldehyde treated mustard oilseed cake on performance of lactating buffaloes. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 6: 257-261.
- Noeroozi Deyarjan, M., Assadi-Alamouti, A., Afzalzadeh, A. and Danesh Mesgaran, M. 2017. Effects of replacing soybean meal with heat-treated soybean meal in diets varying in crude

- protein content on performance of dairy cows under mild heat stress. *Journal of Animal Production*, 19(4): 751-764. (In Persian).
- National Research Council. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids, 1st ed. Washington, D.C.
- Ogimoto, K. and Imai, S. 1981. *Atlas of Rumen Microbiology*. Tokyo: Japan Scientific Societies Press. p. 231.
- Ørskov, E.R. and McDonald, I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. *Journal of Agricultural Research*, 92: 499-503.
- Rae, R.C., Ingalls, J.R. and McKirdy, J.A. 1983. Response of dairy cows to formaldehyde-treated canola meal during early lactation. *Canadian Journal of Animal Science*, 63: 905-915.
- Reynal, S.M., Ipharraguerre, I.R., Lin~eiro, M., Brito, A.F., Broderick, G.A. and Clark, J.H. 2007. Omasal flow of soluble proteins, peptides, and free amino acids in dairy cows fed diets supplemented with proteins of varying ruminal degradabilities. *Journal of Dairy Science*, 90: 1887-1903.
- Rotz, C.A., Satter, L.D., Mertens, D.R. and Muck, R.E. 1999. Feeding strategy, nitrogen cycling, and profitability of dairy farms. *Journal of Dairy Science*, 82: 2841-2855.
- Shelke, S.K., Thakur, S.S. and Amrutkar, S.A. 2012. Effect of feeding protected fat and proteins on milk production, composition and nutrient utilization in Murrah buffaloes (*Bubalus bubalis*). *Animal Feed Science and Technology*, 171: 98-107.
- Sirohi, S.K., Walli, T.K., Garg, M.R. and Kumar, B. 2013. Effect of formaldehyde treated mustard cake on nutrient utilization and milk production performance in crossbred cows fed wheat straw-based diet. *Indian Journal of Animal Nutrition*, 30: 5-11.
- Tahmasbi, A.M., Aazami, M.H. and Naserian, A.A. 2018. Effects of substitution of processed soybean seed with soybean meal on performance, nutrient digestibility, and some blood and ruminal parameters in Holstein dairy cows. *Journal of Ruminant Research*, 5(4): 61-72.(In Persian).
- Throat, S.K., Gupta, R.S., Shankpal, S. and Parnerkar, S. 2016. Effect of supplementing formaldehyde treated rape seed meal on milk production, gross milk composition, digestibility of nutrients and feed conversion efficiency in high producing crossbred cows. *Livestock Research International*, 4: 68-74.
- Uwizeye, A., de Boer, I.J.M., Opio, C.I., Schulte, R.P.O., Falcucci, A., Tempio, G., Teillard, F., Casu, F., Rulli, M., Galloway, J.N., Leip, A., Erisman, J.W., Robinson, T. P., Steinfeld, H. and Gerber, P.J. 2020. Nitrogen emissions along global livestock supply chains. *Nature Food*, 1: 437-446.
- Van Keulen, J. and Young, B.A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. *Journal of Animal Science*, 44(2): 282-287.
- White, C.L., Staines, M. v-H., Phillips, N., Young, P., Coupar, F., Ashes, J.R. and Gulati, S.K. 2004. Protected canola meal increases milk protein concentration in dairy cows fed a grass silage-based diet. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 44 (9): 827-832.
- Wright, C.F., Von Keyserlingk, M.A., Swift, M.L., Fisher, L.J., Shelford, J.A. and Dinn, N.E. 2005. Heat- and lignosulfonate-treated canola meal as a source of ruminal undegradable protein for lactating dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 88: 238-243.

