

Survey of the *in vitro* nutritional value of total mixed rations silage with fresh chopped alfalfa forage at two levels of dry matter and crude protein

Forough Badouei Dalfardi¹, Omid Dayani^{1*}, Ali Reza Aghashahi²,
Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini¹

¹ Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

² Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran

Article Info

Article type:
Research Full Paper

Article history:
Received:
Revised:
Accepted:

Keywords:
Gas production
Nutrients
Silage
Total mixed rations
silage

ABSTRACT

Background and objectives: There is little information about the effect of total mixed rations silage (TMRS) based on alfalfa on nutrient changes, gas production and laboratory digestibility in a certain period of time. On the other hand, due to the wrong way of storing alfalfa in Iran, the main part of its protein is lost, which is in the leaves of plant. In addition, when it is not possible to dry hay, it is necessary to provide a suitable method for its storage. Also, the use of TMRS leads to better feed management and preservation of its nutritional value. The purpose of the present study was to investigate the nutritional value and the trend of nutrient changes of TMRS based on alfalfa.

Materials and methods: The feed ingredients of each ration were mixed together based on the determined percentages for 100 kg. Then they were ensiled in experimental silos with a weight capacity of 2.5 kg. Experimental rations include: 1) TMRS with 35% dry matter ((DM) and 14.5% crude protein (CP), 2) TMRS with 35% DM and 13% CP, 3) TMRS with 40% DM and 14.5% CP, and 4) TMRS with 40% DM and 13% CP. Diets were stored separately, completely mixed in 5 experimental silos. After of 30, 45 and 60 days, the silos were opened and the visual-sensory evaluation, properties and pH of the experimental treatments were performed. DM, organic matter (OM), CP, fat, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), ammonia nitrogen and lactic acid were measured. The volume of gas production in the experimental diets was measured, and then using the information obtained from the gas test, the kinetics of fermentation and gas volume, gas production parameters, gas production efficiency, short chain fatty acids, organic matter digestibility (OMD) and metabolizable energy (ME) were determined.

Results: The results of this research showed that on 0, 30, 45 and 60 days after ensiling, the DM of the rations was affected by the level of DM and the highest amount of DM was observed in the ration containing 40% DM ($P<0.05$). On the 0, 30, 45 and 60 days after ensiling, OM of the rations was affected by interaction effects, and the highest amount of OM related to the ration contained 40% DM and 13% CP, also affected by the main effects and the highest value of OM

was in the diet containing 13% CP and the diet containing 40% DM ($P<0.05$). On the 60 day after ensiling, the NDF of the rations was affected by interaction effects, and the highest amount of NDF was related to the ration containing 40% DM and 14.5% CP ($P<0.05$). On the 0 day after ensiling, the ADF of the rations was affected by interaction effects, and the highest amount of ADF was related to the ration containing 40% DM and 13% CP ($P<0.05$). On the 0 and 60 days after ensiling, the highest gas production potential was related to the diet containing 40% DM and 14.5% CP ($P<0.05$). The flieg point of TMRS on the 45 and 60 days after ensiling was affected by the main effects and the interaction effects, and the highest value was related to the ration containing 40% DM and 14.5% CP ($P<0.05$).

Conclusion: The results of this study showed that the TMRS with 40% DM and 14.5% CP had higher DM, OM, flieg point and sensory evaluation than other rations. In terms of quality, this ration showed a better condition than other rations. Totally, it can be used as a suitable method for preserving alfalfa hay with minimal loss of nutrients in livestock rations.

Cite this article: Badouei Dalfardi, F., Dayani, O., A.R., Sharifi Hosseini, M.M. (2024). Survey of the *in vitro* nutritional value of total mixed rations silage with fresh chopped alfalfa forage at two levels of dry matter and crude protein. *Journal of Ruminant Research*, 12(2),



© The Author(s).

DOI:

Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

پژوهش در نشخوار کنندگان

شایان چاپی: ۲۳۴۵-۴۲۶۱
شاپا اکترونیکی: ۲۳۴۵-۴۲۵۳



بورسی ارزش غذایی بروون تنی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده بر پایه یونجه تازه خرد شده در دو سطح ماده خشک و پروتئین خام

فروغ بدوفی دلفارדי^۱، امید دیانی^{۲*}، علیرضا آفاشاهی^۳، محمدمهری شریفی‌حسینی^۴

^۱ دانشجوی دکتری تغذیه دام بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. ایران

^۲ استاد بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. ایران، رایانامه: odayani@uk.ac.ir

^۳ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

^۴ استادیار بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. ایران

اطلاعات مقاله

نوع مقاله: چکیده

سابقه و هدف: اطلاعات محدودی در رابطه با اثر جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده بر پایه یونجه بر روی تغییرات مواد مغذی، تولید گاز و گوارش پذیری آزمایشگاهی وجود دارد. از طرفی، به دلیل روش نادرست ذخیره‌سازی یونجه در ایران، قسمت عمده‌ی پروتئین خام آن که در برگ متمرک است از بین می‌رود. علاوه بر این، در موقعی که امکان خشک کردن یونجه وجود ندارد، لازم است تا روش مطلوبی برای ذخیره‌سازی آن ارائه گردد. همچنین استفاده از خوراک کاملاً مخلوط سیلوشده سبب مدیریت بهتر خوراک و حفظ ارزش غذایی آن می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارزش غذایی و روند تغییرات مواد مغذی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده بر پایه یونجه بود.

تاریخ دریافت:

تاریخ ویرایش:

تاریخ پذیرش:

واژه‌های کلیدی:

تولید گاز

جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده

سیلیاز

مواد مغذی

مواد و روش‌ها: مواد خوراکی هر جیره بر اساس درصدهای تعیین شده برای ۱۰۰ کیلوگرم با هم مخلوط شدند. سپس سیلیازسازی درون سیلوهای آزمایشی با گنجایش وزنی ۲/۵ کیلوگرم انجام شد. جیره‌های آزمایشی شامل: ۱) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام، ۲) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام، ۳) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام و ۴) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام بودند. جیره‌ها به صورت جداگانه، کاملاً مخلوط و در ۵ سیلوی آزمایشی ذخیره شدند. پس از گذشت ۳۰، ۴۵ و ۶۰ روز درب سیلوها باز و بلافاصله ارزیابی ظاهری-حسی، خصوصیات سیلیوبی و pH بررسی شد. ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام، الیاف نامحلول در شوینده خشی و اسیدی، نیتروژن آمونیاکی و اسید لاکتیک اندازه‌گیری شد. حجم گاز تولیدی جیره‌ها اندازه‌گیری و سپس کنتیک تخمیر و تولید گاز، فراسنجه‌های تولید گاز، بازده تولید گاز، اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و گوارش پذیری ماده آلی تعیین گردید.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان دادند که در روزهای ۰، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ سیلیازسازی، ماده خشک

جیره‌ها تحت تأثیر سطح ماده خشک قرار گرفت و بیشترین درصد ماده خشک در جیره‌های حاوی ۴۰ درصد ماده خشک مشاهد شد ($P<0.05$). در روزهای ۰، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ پس سیلاژسازی، ماده آلی جیره‌ها تحت تأثیر اثرات متقابل قرار گرفت و بیشترین آن مربوط به جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام بود، همچنین تحت تأثیر اثرات اصلی قرار گرفت و بیشترین مقدار مربوط به جیره حاوی ۱۳ درصد پروتئین خام و جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک بود ($P<0.05$). در روز ۶۰ سیلو، الیاف نامحلول در شوینده خشی مربوط به جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام بود ($P<0.05$). در روز صفر سیلو، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی جیره‌ها تحت تأثیر اثرات متقابل قرار گرفت و بیشترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی مربوط به جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام بود ($P<0.05$). در روزهای صفر و ۶۰ پس از سیلو، بیشترین پتانسیل تولید گاز با جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام مشاهده شد ($P<0.05$). نقطه فلیگ سیلاژها در روزهای ۴۵ و ۶۰ سیلاژسازی، تحت تأثیر اثرات اصلی و اثرات متقابل قرار گرفت و بیشترین مقدار مربوط به جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام بود ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد جیره کاملاً مخلوط سیلوشدۀ با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام، مقدار ماده خشک، ماده آلی، نقطه فلیگ و ارزیابی حسی بالاتری نسبت به سایر جیره‌ها داشت. بنابراین این سیلاژ از نظر کیفیت، وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر سیلاژها نشان داد. از این‌رو می‌تواند به عنوان روشی مناسب برای ذخیره‌سازی یونجه با حداقل اتلاف مواد مغذی در جیره دام‌ها استفاده شود.

استناد: بدوى دلفاردی، فروغ؛ ديانى، اميد؛ آفاشاهى، عليرضا؛ شريفى حسینى، محمدمهدى. (۱۴۰۳). بررسی ارزش غذایی برونو تنی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشدۀ بر پایه یونجه تازه خرد شده در دو سطح ماده خشک و پروتئین خام. پژوهش در نشخوارکنندگان، ۱۲(۲)،

DOI:



© نویسنده‌گان.

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آزمایشی، سیلاظر ۴ ماهه خوراک کامل بر پایه تفاله پرتفال با دو جیره خوراک کامل در گوسفند مورد مقایسه قرار گرفت. میانگین مصرف اختیاری ماده خشک سیلاظر خوراک کامل بر پایه تفاله پرتفال ۱۲۸۰ گرم در روز تعیین شد که از دو جیره دیگر (۱۰۶۱ و ۱۲۰۷ گرم در روز) بیشتر بود (Fazaeei, ۲۰۱۸). در تحقیقی، غلظت کمتری از اسیدهای آلی (اسید لاکتیک و اسید استیک) در جیره کامل مخلوط سیلولشدۀ حاوی ذرت کامل در مقایسه با سیلاظر ذرت مشاهده کردند. نکته مهم اینکه پس از ۵۶ روز تخمیر، هر دو سیلاظر دارای مقادیر مشابهی از قندهای محلول و تعداد مخمر بودند، اما سیلاظر جیره کامل مخلوط در مقایسه با سیلاظر ذرت پایداری هوایی بالاتری را نشان داد (Wang و همکاران، ۲۰۱۵).

در زراعت گیاهان علوفه‌ای، افزایش عملکرد علوفه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما عملکرد به‌نهایی تعیین‌کننده مقدار مطلوب علوفه نیست و کیفیت علوفه اهمیت بیشتری دارد (Miller و همکاران، ۲۰۰۱). خشک کردن یونجه در مزرعه سبب از دست رفتن مواد مغذی به‌خاطر آسیب فیزیکی برگ‌ها و اکسیداسیون کاروتون می‌گردد (Kellogg و همکاران، ۱۹۹۶). ایران دارای ۲۰ میلیون هکتار زمین زراعی است. از این میزان، ۲۸۴/۹ هزار هکتار سطح زیر کشت یونجه است که بیشترین سطح را در بین گیاهان علوفه‌ای به‌خود اختصاص داده است (Karimi و همکاران، ۲۰۱۷). در فصول مختلف رشد، شرایط آب‌وهوازی به‌ویژه درجه حرارت هوا، شدت و زاویه تابش نور خورشید تغییر می‌کند که این امر ممکن است بر میزان تولید کربوهی‌درات‌ها (سانختمانی و غیرسانختمانی) و ترکیبات نیتروژن‌دار اثر گذاشته و در نهایت ارزش تغذیه‌ای یونجه خشک را تحت تأثیر قرار دهد (Burns و همکاران، ۲۰۰۵). نتایج پژوهشی در مزارع کشور کانادا نشان داد مخلوط سیلاظر یونجه در ۷۵ درصد مزارع مورد

مقدمه

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد شیر و بیش از ۶۰ درصد گوشت قرمز تولیدی در کشور توسط واحدهای کوچک تولید می‌شود و از طرفی این واحدها امکان تهیه خوراک کامل را ندارند، بنابراین بسیاری از مناطق با عدم توازن در مواد خوراکی مصرفی دام‌ها در واحدها مواجه هستند. از سوی دیگر، طیف گسترده‌ای از این تولیدکنندگان به ناچار اقلام را جداگانه خریداری و گاهی به همان روش (سبوس، دانه‌های جو و ذرت و غیره) مصرف می‌کنند. این روش مصرف، علاوه بر ضایعات خوراک قطعاً بهره‌وری پایینی هم خواهد داشت. استان کرمان به‌ویژه در زمینه پرورش دام کوچک چنین وضعیتی دارد. همچنین دستگاه‌های بسته‌بندی سیلو در کشور با ظرفیت تولید مناسب در قالب کیسه‌های قابل حمل ۴۰ کیلویی مشغول به‌فعالیت بوده که می‌توان برای تهیه سیلاظر استفاده کرد. جیره‌های کامل مخلوط به‌وسیله علوفه‌ها، محصولات جانبی، کنسانتره، مواد معدنی، ویتامین‌ها و مواد افزودنی تولید می‌شوند. حیوانات از این مخلوط‌ها، مواد مغذی مورد نیاز برای تأمین نیازهای نگهداری و تولید را دریافت می‌کنند (Schingoethe, ۲۰۱۷).

جیره کامل مخلوط سیلولشدۀ معمولاً از مخلوط کردن یک علوفه با رطوبت بالا، مواد کنسانتره‌ای، مواد معدنی، ویتامین‌ها، محصولات فرعی کشاورزی و مواد افزودنی تولید می‌شود. اولین مطالعات در مورد جیره کامل مخلوط در دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده گزارش شد (Howard و Owen, ۱۹۶۵). در آزمایشی، سیلاظر خوراک کامل تهیه و در مقاطع مختلف زمانی تا ۲۱۰ روز نمونه‌برداری انجام شد. نتایج نشان داد مخلوط تهیه‌شده از قابلیت خوبی برای سیلو شدن برخوردار بود و تجزیه‌پذیری شکمبهای مواد مغذی این سیلاظر در مقایسه با همین مخلوط به صورت سیلونشده به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (Miyaji و همکاران، ۲۰۱۷). در

.۲۰۰۸)

تعیین ترکیب شیمیایی سیلائزها (ماده خشک، پروتئین خام، عصاره اتری و خاکستر) بر اساس روش‌های استاندارد انجام شد (AOAC، ۲۰۰۵). الیاف نامحلول در شوینده‌ختنی و اسیدی نمونه‌ها به روش ون‌سوئست اندازه‌گیری شد (Van Soast و همکاران، ۱۹۹۱). جهت تعیین میزان نیتروژن آمونیاکی سیلائزها، مقدار ۰/۰۵ گرم نمونه یا محلول استاندارد با ۲/۵ میلی‌لیتر محلول فنول و دو میلی‌لیتر هیپوکلریت ترکیب و در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد برای ۵ دقیقه انکوبه شده و پس از خنک شدن میزان جذب نمونه‌ها توسط اسپکتوفوتومتر (مدل CE292 Series2) شرکت CECI ساخت کشور انگلستان) در طول موج ۳۳۰ نانومتر قرائت شد (Broderick و Kang، ۱۹۸۰).

جهت اندازه‌گیری غلظت اسید لاکتیک سیلائزها، مقدار ۹۰ سی‌سی آب مقطر به ۱۰ گرم از سیلائز تازه اضافه و به مدت ۲ دقیقه تکان داده شد. سپس به مدت ۱۰ دقیقه در ۲۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ (مدل ROTOFIX 32A شرکت Hettich) ساخت کشور آلمان) گردید. مایع بالایی به نسبت ۱ به ۲۰ رقیق شد و ۰/۷ سی‌سی از مایع رقیق شده با ۳ سی‌سی اسید سولفوریک و ۵۰ میکرولیتر سولفات مس پنج‌آبه و ۱۰۰ میکرولیتر از پاراهیدروکسی بی‌فنیل در یک لوله آزمایش مخلوط شد. پس از سرد شدن، میزان جذب نمونه‌ها در طول موج ۵۷۰ نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتوفوتومتر (مدل CE292 Series2) شرکت CECI قرائت گردید (Madrid و همکاران، ۱۹۹۹).

با استفاده از اطلاعات به دست آمده از آزمون گاز، کتیک تخمیر و تولید گاز، فراسنجه‌های تولید گاز، بازده تولید گاز، اسیدهای چرب زنجیر کوتاه، گوارش‌پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم تعیین شد (Hurdy و Fedorak، ۱۹۸۳). روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی مطابق با روش استاندارد (Stingass و Menke، ۱۹۸۸) انجام گرفت. دویست

استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که میزان استفاده از علف خشک یونجه به ۵۵ درصد کاهش یافته است. آن‌ها هم‌چنین خاطر نشان کردند اغلب تولیدکنندگان استفاده از سیلائز را به علف خشک ترجیح می‌دهند (National Research Council، ۲۰۰۱). از این رو هدف از این پژوهش تهیه جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده بر پایه یونجه‌ی تازه با دو سطح ماده خشک و پروتئین خام و بررسی ارزش غذایی، ویژگی‌های سیلویی، روند تولید گاز و گوارش پذیری به روش بروزن‌تنی جیره‌ها بود.

مواد و روش‌ها

مواد خوراکی هر جیره بر اساس درصدهای تعیین شده برای ۱۰۰ کیلوگرم با هم کاملًا مخلوط و همزدہ شد. جیره‌های آزمایشی شامل: (۱) جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام، (۲) جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام، (۳) جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام و (۴) جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام بود. اجزای جیره‌های آزمایشی و ترکیب شیمیایی آن‌ها در جدول ۱ آمده است. جیره‌ها پس از تهیه، کاملًا مخلوط و در ۵ سیلوی آزمایشی (تکرار) با گنجایش وزنی ۲/۵ کیلوگرم (دارای شیر جهت خروج شیرابه‌های سیلوی در پایین هر سیلو) سیلو شدند. پس از گذشت ۳۰، ۴۵ و ۶۰ روز، درب سیلوهای آزمایشی باز و از هر سیلو نمونه برداری انجام شد. نمونه‌ها (نمونه‌های تهیه شده روز اول پیش از سیلوکردن و نمونه سیلائزها) مورد بررسی ظاهری قرار گرفتند (Kilic، ۱۹۸۶) و میزان pH سیلائزها بالاصله پس از باز کردن سیلوها و تهیه نمونه از آن، به ترتیب به وسیله pH متر قلمی دیجیتال AZ 8686 (Taiwan، Eguchi) اندازه‌گیری شد (Taiwan، Eguchi و همکاران،

بررسی ارزش غذایی برون تنی جیره‌های کامل... / فروغ بدوع دلفاردی و همکاران

ثبت شد (Menke و Steingas ۱۹۸۸). رای اندازه‌گیری فراسنجه‌های تولید گاز از رابطه $P = b e^{ct}$ در استفاده شد (Ørskov و McDonald ۱۹۷۹). در این رابطه، b گاز تولیدی از بخش تخمیرپذیر (میلی‌لیتر)، c نرخ تولید گاز در ساعت، t زمان نگهداری بر حسب ساعت و P میزان گاز تولیدی (میلی‌لیتر) در زمان مورد نظر است. داده‌های تولید گاز در نرم‌افزار اکسل وارد شده و سپس نمودار آن رسم گردید.

میلی گرم از هر نمونه با ۳۰ میلی لیتر مایع شکمبه مخلوط شده با بzac مصنوعی به نسبت ۱ به ۲ در داخل ویال‌های ۱۲۰ میلی لیتری با ۵ تکرار تحت گازدهی مداوم دی‌اکسید کربن و به کمک درپوش لاستیکی و پوشش آلومینیومی ریخته و به طور محکم بسته شد. سپس در حمام آب گرم ۳۹ درجه سانتی‌گراد انکوپاسیون شدند. در زمان‌های صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ ساعت انکوپاسیون، میزان فشار گاز با فشارسنج دیجیتالی (مدل 511 Testo) مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ۱- اجزا و ترکیب شیمیایی، جیرهای آزمایشی، (براساس ماده خشک)

Table 1- The ingredients and chemical composition of experimental diets (DM basis)

جیره‌های آزمایشی Experimental diets				اجزاء (درصد) Ingredients
۴۰ درصد ماده خشک 40% DM		۳۵ درصد ماده خشک 35% DM		
۱۳% CP	۱۴.۵% CP	۱۳% CP	۱۴.۵% CP	
35.0	35.0	45.0	45.0	بوچه تازه خرد شده Alfalfa forage
5.0	5.0	0.0	0.0	کاه گندم خرد شده Wheat straw
7.0	7.0	6.0	6.0	تفاله چغندرقند Beet pulp
6.0	6.0	8.0	8.0	دانه ذرت آسیاب شده Corn grain, ground
29.7	30.0	30.0	30.0	دانه جو آسیاب شده Barley grain, ground
13.4	13.4	9.1	8.5	سبوس گندم Wheat bran
3.0	2.0	1.0	1.0	کنجاله سویا Soybean meal
0.0	0.6	0.0	0.5	اوره Urea
0.0	0.1	0.0	0.1	گل گوگرد Sulfur
0.6	0.6	0.6	0.6	مکمل معدنی-ویتامینی ^۱ Vitamin and mineral premix ¹
0.3	0.3	0.3	0.3	نمک Salt
ترکیب شیمیایی Chemical composition				
2.53	2.51	2.54	2.53	انرژی قابل متabolism (مگاکالری در کیلوگرم) ME (Mcal/kg)
40.00	40.00	35.00	35.00	ماده خشک (درصد) (%) Dry matter (%)
13.00	14.50	13.00	14.50	پروتئین خام (درصد) (%) Crude protein (%)
5.05	5.30	5.40	4.42	چربی خام (درصد) (%) Ether extract (%)
90.54	91.20	86.86	90.50	ماده آلی (درصد) (%) Organic matter (%)
22.57	21.08	19.29	22.23	الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد) (%) ADF (%)
48.51	45.87	43.94	54.90	الیاف نامحلول در شوینده خشی (درصد) (%) NDF (%)
23.98	25.53	24.52	16.68	کربوهیدرات‌های غیرالیافی (درصد) (%) NFC (%)

Fe، ویتامین A (IU ٥٠٠٠٠)، ویتامین D3 (IU ١٠٠٠٠)، ویتامین E (IU ١٠٠)، و عناصر معدنی بر اساس میلی گرم بر کیلوگرم شامل:

¹Contains 500,000 IU of Vitamin A; 100,000 IU of Vitamin D₃ and 100 IU of Vitamin E and 3000 mg Fe, 300 mg Cu, 300 mg Mn, 2000 mg Ca, 3000 mg Zn, 90000 mg P, 100 mg Co, 50000 mg Na, 100 mg I, 19000 mg Mg and 0.1 mg Se to Kg.

نتایج و بحث

اطلاعات مربوط به ترکیب شیمیایی جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده در جدول ۲ آورده شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند، درصد ماده خشک و ماده آلی جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده در روزهای ۰، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ پس از سیلازسازی، تحت تأثیر اثرات اصلی سطح ماده خشک قرار گرفت. به طوری که بیشترین مقدار ماده خشک و ماده آلی مربوط به جیره‌های دارای ۴ درصد ماده خشک بود ($P < 0.05$). این می‌تواند به دلیل بالاتر بودن میزان ماده خشک جیره‌های حاوی ۴ درصد ماده خشک باشد. عدم اتلاف در ماده خشک سیلاز ممکن است به دلیل کاهش پساب سیلو باشد (Khorvash و همکاران، ۲۰۰۶). طی آزمایشی، کاهش انداز در درصد ماده خشک ۵ تا ۶ درصد) در طول فرآیند تخمیر در سیلوهای علوفه طبیعی مشاهده شد. با این حال، برای جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده، به نظر می‌رسد این کاهش کمتر باشد (McDonald و همکاران، ۱۹۹۱). توضیح احتمالی در مورد اینکه چرا ترکیب مواد مغذی نزدیک به مقادیر اولیه باقی‌مانده است بدون اینکه تحت تأثیر دوره‌های سیلو کردن یا فعل و افعالات قرار گیرد، می‌تواند به علت بهبود شرایط سیلو کردن و همچنین بالا بودن ماده خشک باشد. همچنین افزایش در محتوای ماده خشک احتمالاً ناشی از محدود شدن رشد و توسعه گروه خاصی از میکرووارگانیسم‌ها در سیلاز و در نتیجه کاهش هدر رفت مواد مغذی سیلاز باشد (Selwet، ۲۰۰۹). پس از اینکه سیلاز به حالت ثبات و پایدار می‌رسد، تخمیر متوقف شده و در pH خیلی پایین جمعیت میکروبی در سیلاز از کاهش ماده خشک ممانعت می‌کند (Bilal، ۲۰۰۹).

نقطه فلیگ جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده با استفاده از معادله زیر محاسبه شد (Can و Denek، ۲۰۰۶):

$$\text{Flieg point} = 220 + (2 \times \text{DM}-15) - (4 \times \text{pH})$$

انرژی قابل متابولیسم، گوارش پذیری ماده آلی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر جیره‌های کاملًا مخلوط سیلو شده با استفاده از رابطه‌های تولید گاز در ۲۴ ساعت محاسبه شد (Menke و همکاران، ۱۹۷۹):

$$\text{ME (Mcal/Kg)} = 2/2 + 0.136 \times \text{GP} + 0.0547 \times \text{CP}$$

$$\text{OMD (\% DM)} = 14/88 + (0.889 \times \text{GP}) + (0.0448 \times \text{CP}) + (0.0651 \times \text{XA})$$

$$\text{SCFA (mM/200 mg DM)} = 0.0222 \text{ GP} - 0.00425$$

که در این روابط GP گاز تولید شده از ۲۰۰ میلی گرم نمونه پس از ۲۴ ساعت، CP درصد پروتئین خام و XA درصد خاکستر در نمونه ماده خوراکی می‌باشد. کربوهیدرات غیرالیافی جیره‌های کاملًا مخلوط سیلو شده با استفاده از معادله زیر محاسبه شد (D'Mello، ۲۰۰۰).

الیاف (درصد) = [کربوهیدرات‌های غیرالیافی پروتئین خام (درصد) + نامحلول در شوینده خشناش] / [خاکستر (درصد) + چربی خام (درصد)]

داده‌های جمع‌آوری شده در قالب طرح کاملًا تصادفی و آزمایش فاکتوریل ۲×۲ براساس مدل آماری زیر با استفاده از روش GLM در نرم‌افزار آماری SAS (۲۰۰۵) تجزیه گردید. از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد.

$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \alpha\beta_{ij} + e_{ijk}$
 در این مدل: Y_{ijk} = متغیر وابسته (صفت اندازه‌گیری شده)، μ = میانگین جامعه برای صفت مورد مطالعه، α_i = اثر سطح ماده خشک، β_j = اثر سطح پروتئین خام، $\alpha\beta_{ij}$ = اثر متقابل ماده خشک × پروتئین خام و e_{ijk} = باقی مانده بود.

بررسی ارزش غذایی برونو تنی جیره‌های کامل... / فروغ بدبوی دلفاردی و همکاران

جدول ۲- ترکیب شیمیایی جیره‌های کامل مخلوط سلولکولر شده.

Table 2- Chemical composition of total mixed rations silage

SEM اشتباه	آلات اصلی						آلات متعالب						زمان سلولکولر کردن (روز)	زمان معدنی مواد معدنی Nutrients
	Main effects			Interaction effects			درصد ماده خشک			درصد ماده خشک				
	DM	CP	ماده خشک	40% DM	40% CP	۱۳٪ CP	۱۴.۵٪ CP	۱۳٪ CP	۱۴.۵٪ CP	۳۵٪ DM	۴۰٪ DM			
CP×DM	P value	DM	CP	۴۰%	۳۵%	۱۴.۵٪	۱۳٪	۱۴.۵٪ CP	۱۳٪ CP	۳۵٪ DM	۴۰٪ DM	Time (day)	Time (day)	Time (day)
0.35	0.03	0.01	0.94	43.93 ^a	40.92 ^b	40.69 ^b	44.16 ^a	45.04	42.82	43.27	38.57	0	0	0
0.89	0.01	0.38	0.26	42.94 ^a	36.06 ^b	40.40	38.60	42.56	43.31	36.44	37.48	30	30	30
0.66	0.01	0.11	0.51	43.31 ^a	36.58 ^b	39.00	40.89	44.50	42.12	37.28	35.89	45	45	45
0.58	0.05	0.17	0.80	42.15 ^a	38.17 ^b	39.27	41.06	42.70	41.61	39.42	36.93	60	60	60
0.01	0.01	0.01	0.62	90.84 ^a	88.67 ^b	89 ^b	90.51 ^a	90.53 ^a	91.15 ^a	90.49 ^a	86.85 ^b	0	0	0
0.01	0.03	0.07	0.92	90.22	89.29	89.12 ^b	90.38 ^a	90.02 ^a	90.42 ^a	90.75 ^a	87.82 ^b	30	30	30
0.03	0.01	0.01	0.68	91.01 ^a	88.24 ^b	88.68 ^b	90.32 ^a	90.79 ^a	90.73 ^a	89.85 ^b	86.6 ^b	45	45	45
0.01	0.01	0.02	0.51	90.76 ^a	89.22 ^b	89.69 ^b	90.56 ^a	91.54 ^a	90.52 ^a	90.60 ^a	87.85 ^b	60	60	60
0.68	0.37	0.33	0.78	13.22	12.9	13.24	12.89	12.98	13.47	12.8	13.01	0	0	0
0.46	0.53	0.01	0.84	14.63	14.39	15.05 ^a	13.97 ^b	14.23	15.03	13.71	15.07	30	30	30
0.31	0.73	0.32	0.41	14.08	14.29	14.29	13.83	14.10	14.09	13.23	14.52	45	45	45
0.99	0.35	0.06	0.99	14.76	15.18	15.41	14.54	15.19	14.33	14.75	15.62	60	60	60
0.60	0.67	0.38	0.46	5.16	4.88	5.31	4.73	5.04	5.28	5.34	4.42	0	0	0
0.57	0.79	0.21	0.13	3.00	3.14	3.40	2.74	2.53	3.48	2.96	3.32	30	30	30
0.91	0.40	0.72	0.72	4.87	4.20	4.40	4.67	5.05	4.69	4.30	4.11	45	45	45
0.22	0.68	0.72	0.75	3.11	3.24	3.36	2.98	3.13	3.08	2.84	3.65	60	60	60
0.01	0.01	0.1	0.62	9.14 ^b	11.31 ^a	10.98 ^a	9.47 ^b	9.45 ^b	8.83 ^b	13.13 ^a	9.49 ^b	0	0	0
0.02	0.41	0.13	0.05	9.77	10.16	10.33	9.60	9.97 ^b	9.57 ^b	9.23 ^b	11.10 ^a	30	30	30
0.01	0.01	0.1	0.68	9.22 ^b	11.74 ^a	11.3 ^b	9.66 ^a	9.19	9.25	10.13	13.35	45	45	45
0.02	0.03	0.32	0.83	9.02 ^b	10.76 ^a	10.36	9.42	9.46	8.59	9.39	12.13	60	60	60
0.11	0.38	0.01	0.53	47.19	49.41	44.9 ^b	51.7 ^a	48.51	45.86	54.89	43.93	0	0	0
0.17	0.10	0.66	0.35	53.80	49.65	51.19	52.26	52.65	54.95	51.87	47.43	30	30	30
0.26	0.04	0.35	0.99	45.22 ^a	41.39 ^b	42.46	44.15	47.10	43.34	41.21	41.57	45	45	45
0.04	0.10	0.83	0.35	52.81	47.93	50.07	50.67	48.45 ^{ab}	57.17 ^a	52.88 ^{ab}	42.97 ^b	60	60	60
0.02	0.26	0.44	0.06	21.82	20.76	21.66	20.93	22.57 ^a	21.08 ^{ab}	19.29 ^b	22.23 ^a	0	0	0
0.95	0.04	0.19	0.73	23.29	25.00	24.66	23.62	22.79	23.79	24.46	25.54	30	30	30
0.91	0.72	0.07	0.43	22.16	22.55	23.40	21.31	21.18	23.15	21.45	23.64	45	45	45
0.26	0.50	0.20	0.20	22.19	22.87	23.18	21.89	22.11	22.27	21.66	24.08	60	60	60

a,b,c Different superscripts of means within the same row show significant differences at ($P<0.05$).

حرف غیر مشابه در هر ردیف نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین میانگین‌ها است ($P<0.05$).

جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده در جدول ۳ آورده شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند در روزهای ۰، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ پس از سیلائرسازی، pH تحت تأثیر اثرات اصلی و اثرات متقابل سطح ماده خشک و پروتئین خام قرار نگرفت. بهترین شاخص برای تعیین کیفیت سیلائر، میزان pH سیلائر است. محدوده pH در سیلائر علوفه پس از تکمیل فرآیند تخمیر، بستگی به نوع علوفه و میزان ماده خشک آن دارد که ممکن است از ۳/۶ تا ۷/۳ متغیر باشد (Kedy, ۲۰۱۲). اما میزان pH مطلوب در علوفه سیلوشده بین ۳/۸ تا ۴/۲ است (McDonald و همکاران، ۱۹۹۱)، که نتایج سیلائرهای حاضر نیز در همین دامنه بود. عموماً pH سیلائر یونجه بهدلیل محتوای پایین قندها و بالا بودن ظرفیت بافری آن به زیر ۴/۴ نمی‌رسد و pH سیلائر یونجه خوب در بازه زمانی ۴/۴-۴/۴ در نوسان است (Ohshima و همکاران، ۱۹۹۷) که با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی دارد. در آزمایش حاضر، در هیچکدام از روزهای سیلائرسازی، غلظت نیتروژن آمونیاکی سیلائرها تحت تأثیر اثرات اصلی و اثر متقابل سطح ماده خشک و پروتئین خام قرار نگرفت. نیتروژن آمونیاکی سیلائر بهترین معرف برای ارزیابی کیفی تخمیر در سیلائر می‌باشد. نیتروژن آمونیاکی زیاد، نشان‌دهنده تخمیر کلستریدیومی است که سبب تولید اسید بوتیریک به مقدار زیاد، افزایش pH و کاهش کیفی سیلائر می‌شود (Miron و همکاران، ۲۰۰۶). در علوفه سیلوشده خوب، میزان نیتروژن آمونیاکی باید کمتر از ۱۰ درصد نیتروژن کل باشد (Raei و همکاران، ۲۰۱۳). میزان نیتروژن آمونیاکی در چنین سطحی نشان می‌دهد pH تا سطحی کاهش یافته است که سبب عدم تکثیر میکروارگانیسم‌های مطلوبی (پروتئولیتیک) می‌شود، که از پروتئین استفاده می‌کنند (Schmid و همکاران، ۱۹۹۷). در پژوهش حاضر، با کاهش مطلوب pH و کیفیت مناسب تخمیر فعالیت باکتری‌های تجزیه-کننده پروتئین کاهش یافته و سبب عدم افزایش غلظت

همچنین ماده آلی تحت تأثیر اثر متقابل درصد ماده خشک و درصد پروتئین خام قرار گرفت و کمترین مقدار ماده آلی با جیره حاوی ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام مشاهده شد ($P<0/05$). این کاهش در درصد ماده آلی می‌تواند به این دلیل باشد که در طول دوره تخمیر سوبسترا تجزیه شده و بخش قابل توجهی از ماده آلی به دی‌اکسیدکربن تجزیه می‌شود (Naghdi و همکاران، ۲۰۲۰).

در روزهای ۰، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ پس از سیلائرسازی، درصد خاکستر جیره‌ها تحت تأثیر اثرات اصلی قرار گرفت، به طوری که بیشترین مقدار مربوط به جیره دارای ۳۵ درصد ماده خشک بود ($P<0/05$). همچنین درصد خاکستر جیره‌ها تحت تأثیر اثر متقابل سطح ماده خشک و پروتئین خام قرار گرفت و بیشترین مقدار خاکستر در جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام مشاهده شد که احتمالاً به علت بالا بودن عناصر موجود در آن می‌باشد ($P<0/05$). طی پژوهشی گزارش شد با افزایش نسبت یونجه در سیلائر ترکیبی سورگوم شیرین و یونجه، مقدار خاکستر افزایش یافت (Chen و همکاران، ۲۰۱۹). در مطالعه حاضر، درصدهای چربی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خشی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده به طور معنی داری تغییر نکردند. در تحقیقی، پژوهشگران هیچ تغییری در مقدار پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خشی و ماده خشک ناپدیدشده جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده حاوی ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ گرم رطوبت در کیلوگرم در ۵۶ روز مشاهده نکردند (Hao و همکاران، ۲۰۱۵). به طور کلی، کیفیت سیلائرها را با توجه به مقدار الیاف نامحلول در شوینده خشی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی آن تعیین می‌کنند (Boga و همکاران، ۲۰۱۴). اطلاعات مربوط به pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسید لاکتیک

بررسی ارزش غذایی برونو تنی جیره‌های کامل‌... / فروغ بدبوی دلفاردی و همکاران

تاثیر اثرات اصلی و اثر متقابل سطح ماده خشک و پروتئین خام قرار نگرفت. اساس تخمیر در سیلو دستیابی به میزان کافی اسید لاکتیک به منظور جلوگیری از رشد میکرووارگانیسم‌های نامطلوب موجود در توده گیاهی و همچنین ممانعت از فعالیت آنزیم‌های کاتابولیکی درون گیاهی است، که در نتیجه منجر به بیشینه حفظ مواد مغذی در سیلاژ می‌شود (Besharati و همکاران، ۲۰۱۷). در مقایسه سیلاژ خوراک کامل بر پایه ذرت علوفه‌ای (با ۴۴ گرم در کیلوگرم ماده خشک) با سیلاژ ذرت علوفه‌ای به تنهایی (حاوی ۱۹۸ گرم در کیلوگرم ماده خشک) پس از ۵۶ روز تخمیر، غلظت کمتری از اسید لاکتیک و اسید استیک در سیلاژ خوراک کامل مشاهده گردید. هر دو سیلاژ دارای مقادیر مشابهی از قندهای محلول در آب و تعداد مخمر بودند، اما سیلاژ خوراک کامل پایداری هوایی بالاتری نشان داد (Wang و همکاران، ۲۰۱۵).

نیتروژن آمونیاکی گردیده است. وقتی مخلوط خوراک کامل از علوفه‌های ذرت، یولاف، یونجه، کاه جو و کاه گندم به همراه کنسانتره با نسبت ۴/۴۴ درصد علوفه و ۶/۵۵ درصد کنسانتره تهیه و سیلو شد، سیلاژ ۴۵ روزه حاوی ۶/۴۸ درصد ماده خشک و از کیفیت تخمیری مطلوبی برخوردار بود. همچنین تعیین پایداری هوایی این سیلاژ براساس تغییرات pH، اسید لاکتیک، اسید استیک، نیتروژن آمونیاکی و تولید اتانول نشان داد که تا ۹ روز در معرض هوا سالم باقی می‌ماند (Yuan و همکاران، ۲۰۱۵). تهیه سیلاژ از خوراک کامل بر پایه تفاله پر تقال تازه و کاه گندم و مکمل شده با نسبت‌های مختلف آرد ذرت، سبوس ذرت، سبوس برنج و تفاله چغندر و همچنین اوره، سولفات‌آمونیوم و مکمل معدنی-سویاتامینی نشان داد که سیلاژ‌های چهار ماهه از ۳/۹۵ تا ۴/۰۵ کیفیت مطلوبی برخوردار بودند و pH آنها بین ۴/۰۱ و ۴/۰۵ بود (Fazaeli، ۲۰۱۸). در روزهای متفاوت سیلاژسازی، غلظت اسید لاکتیک در سیلاژها تحت

جدول -۳ pH، نیتروژن آمونیاکی و اسید لاکتیک جیره‌های کامل‌ مخلوط سیلوشده

Table 3- pH, ammonia nitrogen and lactic acid of total mixed rations silage

P value سطح معنی داری	SEM اشتباه معمار میانگین	اثرات اصلی				اثرات متقابل				زمان سیلو کردن (روز) Time (day)	پارامترها Parameters						
		Main effects		Interaction effects													
		DM ماده خشک	CP پروتئین خام	درصد ماده خشک 40% 40% DM	درصد ماده خشک 35% 35% DM												
CP×DM	CP	DM	40%	35%	14.5%	13%	13% CP	14.5% CP	13% CP	14.5% CP							
0.91	0.06	0.55	0.74	6.78	6.13	6.55	6.36	6.70	6.86	6.01	6.25						
0.75	0.36	0.11	0.05	4.80	4.77	4.86	4.71	4.73	4.87	4.70	4.85						
0.40	0.22	0.13	0.05	4.72	4.62	4.73	4.60	4.66	4.77	4.54	4.69						
0.92	0.25	0.12	0.31	4.30	4.23	4.33	4.20	4.28	4.43	4.03	4.24						
0.67	0.45	0.54	0.04	5.76	5.30	5.70	5.33	5.42	5.97	5.25	5.35						
0.02	0.81	0.37	0.02	5.12	5.25	5.42	4.95	5.52	4.72	4.37	6.12						
0.42	0.21	0.77	0.34	5.41	6.28	5.75	5.95	5.23	5.59	6.66	5.91						
0.76	0.78	0.57	0.78	6.47	6.73	6.35	6.85	5.70	7.25	8.01	5.45						
0.92	0.47	0.22	0.25	5.30	5.75	5.12	5.93	5.67	4.92	6.19	5.32						
0.72	0.82	0.21	0.19	6.17	5.92	5.32	6.77	6.95	5.40	5.25	6.60						
0.29	0.06	0.83	0.07	5.15	6.26	5.65	5.76	5.50	4.80	6.02	6.50						
0.46	0.22	0.06	0.88	6.10	6.66	5.92	6.83	6.72	5.47	6.95	6.37						

به تبع آن انرژی قابل متابولیسم افزایش می‌یابد (Paulo, ۲۰۰۰).

اطلاعات مربوط به ارزیابی حسی، جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده در جدول ۴ آورده شده است. جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۱۴/۵ درصد پروتئین خام و ۴۰ درصد ماده خشک نمره ۲۰ رتبه بسیار خوب، و جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۱۳ درصد پروتئین خام و ۳۵ درصد ماده خشک نمره ۱۷ رتبه خوب را به خود اختصاص دادند. جیره‌های دارای ماده خشک بالاتر دارای نمره مطلوب‌تری بودند. در هنگام سیلائزاسازی سعی شد تا حداقل نفوذ هوا صورت بگیرد. معمولاً کپک‌ها سبب شکستن قندها و اسید لاتکتیک شده و می‌توانند دیواره سلولی را تجزیه کنند. این اргانیسم‌ها در حضور آب، اکسیژن و ماده مناسب به سرعت تکثیر می‌یابند (McDonald و همکاران، ۱۹۹۰). طی پژوهشی، محققین گزارش کردند سیلائز یونجه با ۱۵ درصد خرمای ضایعاتی نمره ۲۰ را به خود اختصاص داد (Rajabi و همکاران، ۲۰۱۶). همچنین پژوهشگران در طی تحقیقی نشان دادند افزودن ملاس چغندرقند به سیلائز ساقه و برگ ذرت شیرین، نمره ارزشیابی ۱۸/۷۲ را به خود اختصاص داد و سبب بهبود کیفیت سیلائز شد (Pasandi و همکاران، ۲۰۱۲).

میزان تولید گاز جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده در شکل ۱ آورده شده است. میزان تولید گاز جیره‌ها تقریباً یکسان بود. نتایج این تحقیق نشان دادند جیره‌های آزمایشی در ۲۴ و ۳۶ ساعت پس از انکوباسیون، تولید گاز بیشتری داشتند. افزایش تولید گاز بیانگر بالا بودن انرژی قابل متابولیسم و نیتروژن قابل تخمیر و نیز سایر مواد مغذی برای فعالیت میکرووارگانیسم‌ها می‌باشد (Getachew و همکاران، ۱۹۹۸).

داده‌های مربوط به انرژی قابل متابولیسم، نقطه فلیگ و ارزشیابی حسی جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده در جدول ۴ آورده شده است. در مطالعه حاضر، نقطه فلیگ جیره کاملًا مخلوط سیلوشده با ۱۴/۵ درصد پروتئین خام و ۴۰ درصد ماده خشک، بیشتر بود که نشان‌دهنده کیفیت بالاتر این سیلائز نسبت به سایر سیلائزهای آزمایشی است. این افزایش کیفیت می‌تواند به علت pH پایین‌تر و ماده خشک بالاتر این جیره باشد. در سیلائز به دلیل فعالیت باکتری‌های مولد اسید لاتکتیک و تحت شرایط بی‌هوایی، کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه‌ها به اسیدهای آلی (عمدتاً اسید لاتکتیک) تبدیل شده و با کاهش pH علوفه از فساد میکروبی محافظت می‌کند (Yousef Elahi و همکاران، ۲۰۱۵). نقطه فلیگ یک ابزار مناسب برای بیان کیفیت سیلو ا است. ارزش بالاتر از ۱۰۰ بسیار خوب، ۸۰-۶۰ خوب، ۶۰-۵۵، متوسط، ۴۰-۲۵ Denek رضایت‌بخش و کمتر از ۲۰ نگران‌کننده است (Can و Denek، ۲۰۰۶). افزایش عدد نقطه فلیگ، نشان‌دهنده pH پایین‌تر و ماده خشک بالاتر در سیلو بوده و نیز نشان می‌دهد سیلائز از نظر جمعیت باکتری‌های اسید لاتکتیکی بالاتر و اسید استیک پایین‌تری برخوردار است (Fallah و همکاران، ۲۰۱۲). انرژی متابولیسمی جیره‌های کاملًا مخلوط سیلوشده از لحاظ آماری متفاوت نبود. تفاوت در انرژی قابل متابولیسم خوراک‌های مختلف، نشان‌دهنده تفاوت در میزان کربوهیدرات‌های قابل تخمیر و نیتروژن قابل دسترس آن‌ها می‌باشد (Khanum و Yaqoob، ۲۰۰۷). بنابراین یکسان بودن انرژی قابل متابولیسم جیره‌ها احتمالاً به دلیل یکسان بودن نیتروژن آمونیاکی جیره‌ها می‌باشد. عمل آوری علوفه از قبیل سیلوکردن، سبب افزایش حلالیت لیگنین و کاهش پیوند بین لیگنین و یا کاهش پیوند بین لیگنین و دیگر اجزای دیواره سلولی شده و

بررسی ارزش غذایی برونو تنی جیره‌های کامل‌... / فروغ بدبوی دلفاردی و همکاران

جدول ۴- انرژی قابل متابولیسم، نقطه فلیگ و ارزشیابی حسی جیره‌های کامل‌اً مخلوط سیلوشده

Table 4- Metabolisable energy, flieg point and sensory evaluation of total mixed rations silage


اثرات اصلی										اثرات مقابله				زمان	پارامترها
			Main effects				Interaction effects				Silvokr	Parameters			
P value	SEM	DM	ماده خشک	CP	پروتئین خام	درصد ماده خشک	۴۰ درصد ماده خشک	۳۵ درصد ماده خشک	۳۵ درصد ماده خشک	دن	(روز)				
CP×DM	CP	DM	معیار میانگین	۴۰%	۳۵%	۱۴.۵%	۱۳%	۱۳% CP	۱۴.۵% CP	۱۳% CP	۱۴.۵% CP	Time (day)			
0.87	0.71	0.75	0.73	2.54	2.5	2.47	2.51	2.47	2.54	2.47	2.53	30	انرژی قابل متابولیسم		
0.91	0.54	0.96	0.57	2.51	2.52	2.56	2.50	2.49	2.56	2.53	2.51	45	(مگاکالری در گیلوگرم)		
0.63	0.92	0.53	0.48	2.49	2.53	2.61	2.58	2.57	2.7	2.56	2.52	60	Metabolisable energy (Mcal/kg)		
0.79	0.03	0.02	0.72	98.9 ^a	87.9 ^b	4.95 ^a	91.4 ^b	100.9	96.8	89.8	85.9	30	نقطه فلیگ		
0.02	0.01	0.04	0.67	103.1 ^a	93.5 ^b	100. ^a	96.2 ^b	102.8 ^a _b	103.2 ^a	97.9 ^{ab}	89.2 ^b	45	Flieg point		
0.01	0.03	0.01	0.96	114.9 ^a	110.5 ^b	113.8	111.6 ^b	113.2 ^a _b	116/6 ^{ab}	114.2 ^{ab}	1069 ^b	60			
0.27	0.21	0.25	0.93	20	19	20	19	20	20	20	19	30	ارزشیابی حسی		
0.24	0.16	0.12	0.81	19	18	19	18	19.5	20	17.3	19.3	45	Sensory evaluation		
0.88	0.31	0.03	0.98	19 ^a	17.1 ^b	19.4	18.2	19.1	20	17	18	60			

^{a,b,c} حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین میانگین‌ها است (P<0.05).

a,b,c Different superscripts of means within the same row show significant differences at (P<0.05).

نتایج مربوط به فرستنجه‌های تولید گاز و گوارش پذیری جیره‌های کامل‌اً مخلوط سیلوشده در جدول ۵ آورده شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند در روزهای صفر و ۶۰ پس از سیلاژسازی، بخش بالقوه تولید گاز جیره‌ها تحت تأثیر اثرات اصلی و اثر مقابل سطح ماده خشک و پروتئین خام اصلی قرار گرفت و بیشترین مقدار مربوط به جیره حاوی ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام بود (P<0.05). میزان گوارش پذیری ظاهری ماده آلی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (Getachew و همکاران، ۲۰۰۲) از مقادیر بالاتری برخوردار هستند (Kotah Zengir، ۲۰۰۷). بین منع نیتروژن و منبع کربوهیدرات برای مؤلفه‌های تولید گاز اثر مقابل وجود دارد و هرچه همزمانی بین تجزیه‌پذیری کربوهیدرات و نیتروژن بهتر باشد و نیز نسبت نیتروژن به کربوهیدرات مناسب‌تر با نیاز میکروب‌ها باشد، بهبود در فرآیند تخمیر در محیط تولید گاز قابل انتظار است (Dewhurst و همکاران، ۱۹۹۵). با توجه به اینکه در جیره حاوی ۴۵ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ پروتئین خام تجزیه‌پذیری کربوهیدرات و نیتروژن بهتر بوده در نتیجه فرآیند تخمیر سبب افزایش تولید گاز شده است.

همچنین حجم گاز تولیدی نشان‌دهنده تخمیر مواد خوراکی برای تولید اسیدهای چرب و برآورده از گوارش پذیری ظاهری می‌باشد (Karabulut و همکاران، ۲۰۰۷). فرستنجه‌های تخمیری و میزان تولید گاز نشان‌دهنده این امر است که در سیلاژ‌های با تولید گاز بیشتر، فرستنجه‌های تخمیری (انرژی قابل متابولیسم، گوارش پذیری ماده آلی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر) از مقادیر بالاتری برخوردار هستند (Getachew و همکاران، ۲۰۰۲). بین منع نیتروژن و منبع کربوهیدرات برای مؤلفه‌های تولید گاز اثر مقابل وجود دارد و هرچه همزمانی بین تجزیه‌پذیری کربوهیدرات و نیتروژن بهتر باشد و نیز نسبت نیتروژن به کربوهیدرات مناسب‌تر با نیاز میکروب‌ها باشد، بهبود در فرآیند تخمیر در محیط تولید گاز قابل انتظار است (Dewhurst و همکاران، ۱۹۹۵). با توجه به اینکه در جیره حاوی ۴۵ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ پروتئین خام تجزیه‌پذیری کربوهیدرات و نیتروژن بهتر بوده در نتیجه فرآیند تخمیر سبب افزایش تولید گاز شده است.



شکل ۱- گاز تولیدی جیره‌های کاملاً مخلوط سیلوشده (میلی لیتر بر گرم ماده خشک نمونه).

Figure 1- Gas production of total mixed rations silage (ml/g of DM).

(Trt1) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام، (Trt2) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۳۵ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام، (Trt3) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام و (Trt4) جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۳ درصد پروتئین خام

Trt1) total mixed rations silage (TMRS) with 35% dry matter ((DM) and 14.5% crude protein (CP), Trt2) TMRS with 35% DM and 13% CP, Trt3) TMRS with 40% DM and 14.5% CP, and Trt4) TMRS with 40% DM and 13% CP.

(۲۰۰۰). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش گوارش‌پذیری جیره‌های دارای کنسانتره زیاد، به افزایش تخمیر و تولید گاز این جیره‌ها مرتبط باشد. در پژوهشی، سیلاظاسازی جیره کاملاً مخلوط تهیه شده از مخلوط کاه برنج، سبوس برنج، تفاله خشک چغندر، کنسانتره و مکمل مواد معدنی- ویتامینی در مقایسه با حالت سیلوشده، سبب بهبود گوارش‌پذیری ماده خشک (از ۶۵/۶ به ۶۹ درصد) و ماده آلی (از ۷۱ به ۷۴ درصد) شد (Cao و همکاران، ۲۰۱۰). همچنین در تحقیقی که مخلوط کاملی مشکل از علف ری- گراس، برنج ضایعاتی، تفاله چغندر، کنجاله سویا، مکمل معدنی-ویتامینی را به مدت چهار ماه سیلو کردن، گوارش‌پذیری ماده خشک و ماده آلی طی فرآیند سیلوشدن افزایش یافت (Miyaji و همکاران، ۲۰۱۷).

ارتباط بسیار نزدیکی بین گاز تولیدی و تخمیر ماده آلی بهویژه کربوهیدرات‌ها وجود دارد، زیرا گاز تولیدی نتیجه تجزیه ماده آلی است (Getachew و همکاران، ۱۹۹۸). طی تحقیقی گزارش شد گوارش‌پذیری ماده آلی جیره‌های دارای کنسانتره بالاتر در مقایسه با جیره‌های دارای کنسانتره پایین‌تر کمتر بود (Yogianto و همکاران، ۲۰۱۴). در جیره‌های دارای کنسانتره بیشتر، باکتری‌ها سوبسترای بیشتری برای تخمیر دارند (Manatbay و همکاران، ۲۰۱۴). زیرا زمانی که مقدار زیادی کربوهیدرات‌های سهل‌الهضم (جیره‌های دارای کنسانتره بیشتر) در مقایسه با کربوهیدرات‌های ساختمانی (جیره‌های دارای کنسانتره کمتر) در دسترس باکتری‌های شکمبه قرار می‌گیرد، مقدار زیادی اسیدهای چرب فرار در یک مدت زمان معین تولید می‌شود (D'Mello).

بررسی ارزش غذایی بروون تنی جیره‌های کامل... / فروغ بدبوی دلفاردی و همکاران

جدول ۵- فرآیندهای تولید گاز، اسیدهای چرب کوتاه، زنجیر و گوارش پلیمری ماده آبی جیره‌های کاملاً مخلوط سبلوکنده

Table 5- Parameters of gas production and organic matter digestibility of total mixed rations silage

P value	SEM	Main effects			Interaction effects			زمان (روز)	سبلوکنن
		DM	CP	مشتقات میانی	مشتقات نماینده	40% DM	35% DM		
CP×DM									
0.01	0.02	0.01	0.61	59.1 ^a	55.5 ^b	57.84 ^a	56.79 ^b	56.1 ^{ab}	62.24 ^a
0.62	0.07	0.07	63.41	64.17	63.65	63.93	65.11	61.71	62.74
0.67	0.08	0.06	66.4	67.00	66.94	71.61	66.78	66.08	66.73
0.02	0.01	0.13	0.47	74.78	73.84	73.46	75.16	75.30 ^{ab}	78.31 ^a
0.21	0.43	0.18	0.09	0.026	0.027	0.023	0.029	0.027	0.024
0.53	0.32	0.63	0.02	0.030	0.020	0.025	0.035	0.039	0.025
0.91	0.75	0.01	0.029	0.025	0.028	0.026	0.026	0.270	0.030
0.58	0.61	0.24	0.01	0.035	0.031	0.029	0.037	0.040	0.029
0.86	0.83	0.91	18.84	78.71	80.53	79.19	80.06	78.99	78.44
0.89	0.97	0.59	11.84	79.92	80.08	78.58	81.42	80.99	78.84
0.71	0.67	0.85	15.46	79.13	82.04	79.94	81.24	79.79	78.48
0.78	0.77	0.87	16.27	79.29	81.43	79.79	80.93	78.84	79.74
0.97	0.98	0.29	0.46	1.20	1.21	1.22	1.19	1.20	1.22
0.62	0.73	0.68	0.23	1.30	1.20	1.19	1.23	1.25	1.18
0.81	0.45	0.44	0.35	1.27	1.25	1.18	1.31	1.23	1.70
0.62	0.57	0.73	0.57	1.19	1.23	1.21	1.24	1.27	1.30

جروف غرب نیشله در روز شناختنده وجود اختلاف معنی دار بین میانگینها است ($P<0.05$).^{a,b,c}

a,b,c Different superscripts of means within the same row show significant differences at ($P<0.05$).

فرآیندهای تولید گاز، اسیدهای چرب کوتاه، زنجیر و گوارش پلیمری ماده آبی جیره‌های کاملاً مخلوط سبلوکنده

Gas test parameters

زمان (روز)

سبلوکنن

زمان (روز)

زمان (روز

جیره سبب بهبود معنی دار شاخص کیفی و نمره ارزشیابی سیلاظر گردید. لذا مواد مغذی این جیره دارای حداقل اتلاف بوده و استفاده از آن برای تغذیه دام توصیه می شود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد جیره کاملاً مخلوط سیلوشده با ۴۰ درصد ماده خشک و ۱۴/۵ درصد پروتئین خام دارای ماده خشک و ماده آلی بیشتری بود. همچنین این سطح ماده خشک و پروتئین خام در

References

- AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of AOAC International. Maryland. USA.
- Besharati, M., Shafipour. N., Abdi. E. and Nemati, Z. 2017. Effects of supplementation alfalfa silage with molasses, orange pulp and Lactobacillus buchneri on *in vitro* dry matter digestibility and gas production. Journal of Bioscience and Biotechnology, 6(1):43-47.
- Bilal, M.Q. 2009. Effect of molasses and corn as silage additives on the characteristics of mott dwarf elephant grass silage at different fermentation periods. Pakistan Veterinary Journal, 29:19-23.
- Boga, M., Yurtseven, S., Kilic, U., Aydemir, S. and Polat, T. 2014. Determination of nutrient contents and *in vitro* gas production values of some legume forages grown in the harran plain saline soils. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27:825-831.
- Broderick, G.A. and Kang, J.H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and *in vitro* media1. Journal of Dairy Science, 63(1):64-75.
- Burns, J.C., Mayland, H.F. and Fisher, D.S. 2005. Dry matter intake and digestion of alfalfa harvested at sunset and sunrise. Journal of Animal Science, 83: 262-270.
- Cao, Y., Takahashi, T., Horiguchi, K., Yoshida, N. and Cai, Y. 2010. Methane emissions from sheep fed fermented or non-fermented total mixed ration containing whole-crop rice and rice bran. Animal Feed Science and Technology, 157:72-78.
- Chen, L., Dong, Z., Li, J. and Tao, S. 2019. Ensiling characteristics, *in vitro* rumen fermentation, microbial communities and aerobic stability of low-dry matter silages produced with sweet sorghum and alfalfa mixtures. Journal of Science Food Agriculture, 99:2140–2151.
- Denek, N. and Can, A. 2006. Feeding value of wet pomece ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research, 65:260-265.
- Dewhurst, R.J., Hepper, D. and Webster, A.J.F. 1995. Comparison of *in sacco* and *in vitro* techniques for estimating the rate and extent of rumen fermentation of a range of dietary ingredients. Animal Feed Science and Technology, 51: 211-229.
- D'Mello, J.P.F. 2000. Farm Animal Metabolism and Nutrition. CABI Publishing, Wallingford, 438 pp. Glauert A. M, Dingle JT and Lucy JA. 1962. Action of saponin on biological membranes. Nature, 196:953-955.
- Eguchi, K., Hattori, I., Sawai, A. and Muraki, M. 2008. Fermentation quality of purple corn [zea mays] silage. (National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, Kushi, Kumamoto (Japan). Journal of Japanese Society of Grassland Science, 54:141-149.
- Fallah, R., Kiani, A. and Azarfara A. 2012. The effect of adding sour yogurt as an inoculant on the quality of fodder corn silage. The first national congress of new Agricultural Science and Technological, 92:85-92. (In Persian).
- Fazaeli, H. 2018. Agriculture by-products, Processing and Utilization in Animal Feeding. Press Animal Science Research Institute (ASRI), Karaj, Iran, 467 pp (In Persian).
- Fedorak, D.E. and Hurdy, D.E. 1983. A simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultures in serum bottles. Environment Technologycal, 4:425-432.
- Getachew, G., Makkar, H.P.S. and Becker, K. 1998. The *in vitro* gas coupled with ammonia measurement for evaluation of nitrogen degradability in low quality roughages using incubation medium of different buffering capacity. Journal Science Food Agricultural, 77:87-95.

17. Getachew, G., Makkar, H.P.S. and Becker, K. 2002. Tropical browses: content of phenolic compounds, *in vitro* gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acids and *in vitro* gas production. *Journal of Agriculture Science*, 139:341-352.
18. Hao, W., Wang, H.L., Ning, T.T., Yang, F.Y. and Xu, C.C. 2015. Aerobic stability and effects of yeasts during deterioration of non-fermented and fermented total mixed ration with different moisture levels. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 28:816–826.
19. Karabulut, A., Canbolat, O., Kalkan, H., Gurbuzol1, F., Sucu, E. and Filya, I. 2007. Comparison of invitro gas production, metabolizable energy, organic matter digestibility and microbial protein production of some legume hays. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 4: 517-522.
20. Karimi, H. 2017. Alfalfa. 1st edition. Author, University Publishing Center, 50-85.
21. Kellogg, D. and Owen, F. 1969. Relation of ration sucrose level and grain content to lactation performance and rumen fermentation. *Journal of Dairy Science*, 52(5):657-662.
22. Khanum, S.A. and Yaqoob. T. 2007. Nutritional evaluation of various feedstuffs for livestock production using *in vitro* gas method. *Pakistan Veterinary Journal*, 27(3):129-133.
23. Khorvash, M., Colombatto, D., Beauchemin, K.A. Ghorbani, G.R. and Samei, A. 2006. Use of absorbants and inoculants to enhance the quality of corn silage. *Canadian Journal of Animal Science*, 86:97-107.
24. Kedy, T. 2012. High feed value grass silage: its importance and production. Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Ireland. <https://www.teagasc.ie/media>.
25. Kilic, A. 1986. Silo Feed (Instruction, Education and Application Proposals). Bilgehan Press. Izmir, 327 Pp.
26. McDonald, L., Henderson, N. and Heron, S. 1990. *The Biochemistry of Silage*. 2nd ed., Chalcombe Pub., UK.
27. Madrid, J., Martínez-Teruel, A., Hernández, F. and Megías, M.D. 1999. A comparative study on the determination of lactic acid in silage juice by colorimetric, high-performance liquid chromatography and enzymatic methods. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 79(12):1722-1726.
28. Manatbay, B., Cheng, Y., Mao, S. and Zhu, W. 2014. Effect of gynosaponin on rumen *in vitro* methanogenesis under different forage-concentrate ratios. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 27:1088-1097.
29. McDonald, P., Henderson, A.R. and Heron, S.J.E. 1991. *The Biochemistry of Silage*. 2nd ed. Chalcombe Publications. Marlow, UK.
30. Menke, K.H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and *in vitro* gas production using rumen fluid. *Animal Research Development*, 28:7-55.
31. Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D. and Schneider, W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolisable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor *in vitro*. *Journal of Agriculture and Food Sciences*, 93:217–222.
32. Miyaji, M., Matsuyama, H. and Nonaka, K. 2017. Effect of ensiling process of total mixed ration on fermentation profile, nutrient loss and *in situ* ruminal degradation characteristics of diet. *Animal Science Journal*, 88:134-139.
33. Miller, L.A., Moorby, J.M., Davies, D.R., Humphreys, M.O., Scollan, N.D., MacRae, J.C. and Theodorou, M.K. 2001. Increased concentration of water-soluble carbohydrate in perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.): milk production from late-lactation dairy cows. *Grass and Forage Science*, 56:383-394.
34. Miron, J., Solomon, R., Adin, G.U., Nikbakht, M., Yosef, E., Carmi, A., Weinberg, T., Kipnis, Z.G., Zuckerman, E. and Ben-Ghadalia, D. 2006. Effects of harvest stage, re-growth and ensilage on the yield, composition and *in vitro* digestibility of new forage sorghum varieties. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 86:140-147.
35. Naghdi, Z., Dayani, O., Tahmasbi, R., Khezri, A., Sharifi Hoseini, M.M. and Hajalizadeh, Z. 2020. The effect of feeding of *Mentha pulegium* pulp silage with wasted date on dry matter intake, digestibility and ruminal and blood parameters of Kermani mature rams. *Journal of Ruminant Research*, 8(3):29-44.

- 36.National research council. 2001. Nutrient requirement of dairy cattle. 7th rev. ed. National academy press. Washington.
- 37.Ørskov, E.R. and McDonald, I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. *Journal of Agricultural Science, (Cambridge)* 92:499-503.
- 38.Oshima, M., Kimura, E. and Yokota, H. 1997. A method of making good quality silage from direct cut alfalfa by spraying previously fermented juice. *Animal Feed Science and Technology*, 66:129-137.
- 39.Owen, F. and Howard, W. 1965. Effect of ration moisture level on value of alfalfa plus cracked corn as a complete-feed silage for lactating cows. *Journal of Dairy Science*, 48:1310–1314.
- 40.Pasandi, M., kamali, R. and kavian, A. 2012. The use of molasses to improve the fermentation of sweet corn stover silage. *Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi)*, 95:27-32.
- 41.Paulo, R.F. 2000. Additives to improve the silage making process with tropical forages. Departamento de Zootecnia, Faculdade de Agronomia Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- 42.Raei, Y., Jorat, M., Moghaddam, H., Chaich, M.R. and Weisany, V. 2013. Effect of density on onnoteative and collective yield of forage sorghum under water limitation. *Journal of Agricultural Science and Ustainable Product*, 4:51-65.
- 43.Rajabi, R., Tahmasbi, R., Dayani, O. and Khezri, A. 2016. Chemical composition of alfalfa silage with waste date and its feeding effect on ruminal fermentation characteristics and microbial protein synthesis in sheep. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 101:466-474.
- 44.SAS. 2005. SAS User's Guide. Statistics. Version 9.1.3 Edition. SAS Inst., Inc., Cary NC.
- 45.Selwet, M. 2009. Effect of propionic and formic acid mixtures on the fermentation, fungi development and aerobic stability of maize silage. *Polish Journal of Agronomy*, 1:37-42.
- 46.Schmid, J., Sipocz, J., Kaszfis, I., Szakfics, G. and Gyepesm, A. 1997. Preservation of sugar content in ensiled sweet sorghum. *Journal of Technology*, 60:913-920.
- 47.Schingoethe, D.J. 2017. A 100-Year Review: Total mixed ration feeding of dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 100:10143–10150.
- 48.VanSoest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A. 1994. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*, 74:358-359.
- 49.Wang, H., Ning, T., Hao, W., Zheng, M. and Xu, C. 2015. Dynamics associated with prolonged ensiling and aerobic deterioration of total mixed ration silage containing whole crop corn. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 29:62-72.
- 50.Wolin, M.J. 1960. A theoretical rumen fermentation balance. *Journal of Dairy Science*, 43:1452–1459.
- 51.Yogianto, A., Sudarman A., Wina, E. and Jayanegara, A. 2014. Supplementation effects of tannin and saponin extracts to diets with different forage to concentrate ratio on *in vitro* rumen fermentation and methanogenesis. *Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture*, 39:144-151.
- 52.Yousef Elahi, M., Sheibani, F. and Kardan, V. 2015. The effect of different levels of waste dates with banana leaf and stem silage on the nutritional value and parameters of gas production. First International Conference and Second National Conference on Agriculture, Environment and Food Security.
- 53.Yuan, X.J., Guo, G., Wen, A., Desta, S.T., Wang, J., Wang, Y. and Shao, T. 2015. The effect of different additives on the fermentation quality, *in vitro* digestibility and aerobic stability of a total mixed ration silage. *Animal Feed Science and Technology*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci>. 2015.06.001.